

재택 자가 검사 수행 관련 팁



대기

- **검사 유효일을 확인하세요.** 유효기간이 지난 검사 또는 손상되었거나 변색된 검사 도구를 사용하지 마세요.
- **상자의 안내 사항을 읽어보세요.** 안내된 절차를 꼼꼼하게, 지시된 순서를 지켜서 따라주세요. 그렇지 않은 경우 검사 결과가 부정확할 수 있습니다.
- **검사를 시작할 준비가 되기 전까지는 검사 키트를 열지 마세요.** 검사를 실시할 탁자 또는 기타 표면을 청소하세요.
- **검체를 채취하기 전에 비누와 물로 손을 씻으세요.**
- **검사 키트나 도구를 재사용하지 마세요.**
- **검사를 완료한 후 손을 씻으세요.**

검사 결과의 해석

- **재택 자가 검사의 경우 의료진이 수행하는 검사보다 결과가 부정확할 수 있습니다.** 일부의 경우 또 다른 COVID-19 검사를 받아 결과를 확실히 알아보아야 하는 이유이기도 합니다(이러한 검사를 **확인검사**라고 합니다).

재택 자가 검사 결과		해야 하는 일
검사 결과가 양성인 경우		10일 동안 자가 격리하시고, 의료진에게 양성 검사 결과를 알리세요. 가족과 밀접 접촉자 ² 에게도 양성 검사 결과를 알리세요. 필요한 경우 가족과 밀접 접촉자도 자가 격리를 실시하고 검사를 받아야 합니다.
검사 결과가 음성이지만...	COVID-19 증상 ³ 이 있는 경우	10일 동안 자가 격리하시고, 확인 검사를 받으세요.
	증상이 없지만 최근 COVID-19 확진자와 밀접 접촉한 경우	백신 접종을 완료하지 않은 경우: 10일 동안 자가 격리하세요. 확인 검사에서 음성 결과를 받았거나, COVID-19 확진자와 밀접 접촉 후 5일 이상 지났거나, 또는 2차 재택 자가 검사를 수행한 경우 7일 동안 자가 격리할 수 있습니다. (재택 자가 검사를 두 번 수행하는 경우, 첫 검사는 밀접 접촉 후 5일 후에 수행해야 합니다. 두 번째 검사는 첫 검사 후 24시간, 또는 제조업체의 안내에 따라 그 이상의 시간이 흐른 후에 수행해야 합니다.) 백신 접종을 완료했거나⁴ 지난 3개월 내에 COVID-19에 걸렸다가 회복된 경우:⁵ 취해야 하는 조치가 없습니다. 증상이 있는 경우 다시 검사를 받으세요.
	증상이 없으며 최근 COVID-19 확진자와 밀접 접촉하지 않은 경우	취해야 하는 조치가 없습니다.
검사 결과가 무효하거나 오류가 나온 경우		<ul style="list-style-type: none"> ● 상자의 안내 사항을 따라주세요. ● COVID-19 증상이 있거나 COVID-19 확진자와 밀접 접촉한 경우, 다시 한 번 검사를 받으세요.

기타 언어의 경우
여기를 스캔하세요



¹ **확인 검사(confirmatory test)** 란 병원, 약국, 긴급 케어 클리닉 또는 COVID-19 검사소와 같은 의료시설에서 시행하는 PCR 검사와 같은 분자 검사 또는 항원 검사입니다. 재택 자가 검사용 키트로 채취한 검체를 사용해 실험실에서 판독하는 검사의 경우도 확인 검사로 간주할 수 있습니다.

² **밀접 접촉**이란 24시간 기간 내에 COVID-19 확진자와 10분 이상 6피트보다 가까운 거리에 있었음을 의미합니다. **증상이 있는 경우,** 밀접 접촉은 증상 시작일로부터 이를 전을 의미합니다. **증상이 없는 경우,** 밀접 접촉은 양성 검사 결과가 나온 날짜로부터 이를 전을 의미합니다.

³ **COVID-19 증상**은 발열, 오한, 기침, 숨가쁨, 호흡곤란, 피로, 근육통 또는 몸살, 두통, 미각이나 후각의 상실, 인후염, 코막힘, 콧물, 메스꺼움, 구토, 설사 등을 포함합니다.

⁴ **백신 접종 완료**란 **최소 2주일 이전에** 다음을 접종했음을 의미합니다.

- Pfizer-BioNTech 또는 Moderna 등 2차에 걸쳐 접종하는 백신의 2차 접종
- Johnson & Johnson/Janssen 등 1차만 접종하는 백신의 1차 접종.

⁵ COVID-19 진단 검사에서 양성 결과를 받은 후, **회복 후 3개월**은 COVID-19 증상이 처음 발현한 날짜부터 계산합니다. 증상이 없는 경우에는 처음으로 양성 진단 결과를 받은 날부터 계산합니다.