

التطعيم للجميع.



الجرعات الداعمة من لقاح فايزر لمكافحة فيروس كورونا (COVID-19)

الأسئلة المتداولة

لماذا يوصى بالحصول على الجرعة الداعمة؟

لا يزال لقاح فايزر فعالاً للغاية في الوقاية من الأمراض الشديدة ودخول المستشفى للعلاج والوفاة بسبب فيروس كورونا (COVID-19). ومع ذلك، تُظهر بعض الدراسات أن الحماية من العدوى من لقاح فايزر قد تبدأ في الانخفاض بعد حوالي ستة أشهر. قد توفر الجرعة الداعمة حماية إضافية للأشخاص المعرضين لخطر متزايد للتعرض لفيروس كورونا (COVID-19) أو لمرض شديد بسبب فيروس كورونا (COVID-19)، خاصة مع وجود متحور دلتا المنتشر في مجتمعاتنا.

هل الجرعة متاحة للأشخاص الذين تلقوا لقاح فيروس كورونا (COVID-19) من Moderna أو Johnson & Johnson؟

تكون جرعة فايزر الداعمة متاحة فقط للأشخاص المؤهلين الذين تلقوا أول جرعتين من لقاح فايزر. ولم تتم الموافقة على إعطاء جرعة فايزر الداعمة للأشخاص الذين حصلوا على لقاح Moderna أو Johnson & Johnson.

ما الحالات الطبية التي تزيد من خطر الإصابة بمرض شديد بسبب فيروس كورونا (COVID-19)؟

تشتمل الحالات الطبية التي تزيد من خطر فيروس كورونا (COVID-19) الشديد على السكري وحالات القلب ومرض الكلى المزمن ومرض الرئة المزمن ومرض الكبد والسرطان والخرف وفيروس نقص المناعة البشرية (HIV) والحمل. للاطلاع على القائمة الكاملة، يُرجى زيارة

cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html

من الأشخاص الأكثر عرضة لخطر التعرض لفيروس كورونا (COVID-19) في مكان عملهم أو مكان آخر؟

تشمل الوظائف التي قد تزيد من خطر التعرض لفيروس كورونا (COVID-19) العاملين في مجال الرعاية الصحية والمدرسين وموظفي

يوصى بإعطاء جرعة داعمة من لقاح فايزر للأشخاص المؤهلين الذين تلقوا جرعتهم الثانية من لقاح فايزر منذ ستة أشهر أو أكثر والمعرضين لخطر متزايد للتعرض لفيروس كورونا (COVID-19) أو لمرض شديد بسبب فيروس كورونا (COVID-19)، بما في ذلك الأشخاص في سن 65 عاماً وأكبر. يجب إعطاء الجرعة الداعمة بعد ستة أشهر أو أكثر من جرعة فايزر الثانية.

ما المقصود بالجرعة الداعمة؟

الجرعة الداعمة عبارة عن جرعة إضافية للقاح للأشخاص الذين كُونوا الحماية من اللقاح ولكن هذه الحماية ربما تكون انخفضت بمرور الوقت (يُعرف هذا باسم تضائل المناعة).

من الذي يمكنه الحصول على جرعة داعمة؟

تكون المجموعات التالية التي تلقت الجرعة الثانية من لقاح فايزر مؤهلة لأخذ جرعة داعمة من لقاح فايزر بعد ستة أشهر من الجرعة الثانية:

- + الأشخاص الذين يبلغون من العمر 65 عاماً أو أكبر
- + الأشخاص الذين يعيشون في دار ترميز أو في أحد مرافق الرعاية طويلة الأجل الأخرى
- + الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم من 18 إلى 64 عاماً والذين يعانون من حالة طبية كامنة تزيد من خطر تعرضهم لإصابة شديدة بفيروس كورونا (COVID-19)
- + الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم من 18 إلى 64 عاماً والمعرضون لخطر متزايد للتعرض لفيروس كورونا (COVID-19) بسبب وظيفتهم (على سبيل المثال، العاملون في مجال الرعاية الصحية والمدرسون) أو المكان الذي يعيشون فيه أو يزورونه بشكل متكرر (على سبيل المثال، ملجأ مشردين)

الرعاية النهارية والعاملين في المطاعم ومتاجر البقالة. تشمل الأماكن الأخرى التي قد يكون فيها خطر التعرض المتزايد ملاجئ المشردين والسجون.

كيف يمكنني معرفة ما إذا كنت بحاجة لجرعة داعمة أم لا؟

تحدث إلى مقدم الرعاية الصحية إذا كانت لديك أسئلة حول ما إذا كان يجب عليك الحصول على جرعة داعمة أم لا. إذا احتجت إلى مساعدة في البحث عن مقدم خدمات، فاتصل برقم 311.

هل يمكن للنساء الحوامل أو المرضعات أو اللاتي يحاولن الحمل الحصول على جرعة داعمة؟

تتعرض الحوامل وتحديثًا الحوامل حديثًا لخطر متزايد للإصابة بأمراض خطيرة من فيروس كورونا (COVID-19) مقارنة بغير الحوامل. يجب تطعيم الحوامل ضد فيروس كورونا (COVID-19). إذا استوفت الحوامل معايير الأهلية، فيجب أن يحصلن على جرعة داعمة.

ما مخاطر الحصول على جرعة داعمة؟

بالنسبة للعديد من الأشخاص الذين تلقوا جرعتين من لقاح فايزر، فإن فوائد الحصول على جرعة داعمة تفوق أي مخاطر. حتى الآن، كانت ردود الفعل المبلغ عنها بعد الحصول على الجرعة الثالثة مماثلة لتلك التي حدثت بعد أول جرعتين. كانت الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا التي تم الإبلاغ عنها هي التعب ووجع الذراع. كانت معظم الآثار الجانبية خفيفة إلى معتدلة. الآثار الجانبية نادرة الحدوث، ولكنها قد تحدث بعد جرعة داعمة.

هل الجرعة الداعمة هي نفس اللقاح مثل أول جرعتين؟

نعم. جرعة فايزر الداعمة هي نفس اللقاح والجرعة مثل كل جرعة من الجرعتين الأوليين.

متى يجب علي الحصول على جرعة داعمة؟

يجب عليك الحصول على جرعة داعمة بعد ستة أشهر أو أكثر من تلقي جرعتك الثانية من لقاح فايزر.

إذا احتجنا إلى جرعة داعمة، فهل هذا يعني أن اللقاحات لا تعمل؟

لا، لقاحات فيروس كورونا (COVID-19) تعمل بشكل جيد للوقاية من الأمراض الشديدة ودخول المستشفى لتلقى العلاج والوفاة، حتى ضد متحور دلتا المنتشر على نطاق واسع. ومع ذلك، بدأ خبراء الصحة العامة في ملاحظة انخفاض طفيف في الحماية، خاصة بين فئات سكانية معينة.

أنا منقوص المناعة وحصلت على جرعة لقاح ثالثة. هل يجب علي الحصول على جرعة داعمة أيضًا؟

لا، لا توجد توصية بتلقي جرعة رابعة حاليًا. للحصول على معلومات حول الجرعات الثالثة للأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة بشكل معتدل إلى شديد، تفضل بزيارة

nychealthandhospitals.org/covid-19-vaccines

أين يمكنني الحصول على جرعة داعمة مجانية؟

جرعات فايزر الداعمة متاحة في 11 مستشفى في نظام NYC Health + Hospitals. لست بحاجة إلى الذهاب إلى نفس الموقع الذي حصلت فيه على أول جرعتين من لقاح فايزر. اذهب مباشرة إلى أي مستشفى للعناية بالحالات الخطرة تابع لـ NYC Health + Hospitals للحصول على جرعتك الداعمة، حدد موعدًا من أجل الجرعة الداعمة على

covid19.nychealthandhospitals.org/

[COVIDVaxEligibility](https://covid19.nychealthandhospitals.org/covid19-vaccine-eligibility) أو اتصل على الرقم 1-877-829-4692

للحصول على مساعدة بلغات عديدة. جرعات فايزر الداعمة غير متاحة في مواقع NYC Health + Hospitals/Gotham Health.

هل يمكنني الحصول على جرعة داعمة في نفس وقت الحصول على لقاحات أخرى (مثل لقاح الإنفلونزا)؟

نعم. من الآمن الحصول على جرعة داعمة في نفس وقت اللقاحات الأخرى أو في أي وقت قبل أو بعد ذلك. إذا لم تكن قد حصلت على لقاح الإنفلونزا بعد، فهما متاحان في مواقع NYC Health + Hospitals للعناية بالحالات الخطرة.

هل أحتاج إلى جرعة داعمة لكي أكون مُطعمًا تطعيمًا كاملاً؟

لا، يعتبر الأشخاص مُطعمين تطعيمًا كاملاً بعد أسبوعين من الجرعة الثانية من اللقاح المكون من جرعتين (مثل فايزر أو Moderna) أو بعد أسبوعين من اللقاح المكون من جرعة واحدة مثل لقاح Johnson & Johnson.

هل ستكون الجرعات الداعمة إلزامية؟

لا ينطبق فرض التطعيم في ولاية نيويورك للعاملين في مجال الرعاية الصحية إلا على الجرعتين الأولى والثانية. لا يشتمل الفرض على الجرعات الداعمة: