



DES VACCINS POUR TOUS.

Injections de rappel Pfizer COVID-19

Foire aux questions

Une injection de rappel du vaccin Pfizer COVID-19 est recommandée aux personnes remplissant les conditions requises qui ont reçu leur deuxième dose du vaccin Pfizer COVID-19 il y a six mois ou plus et qui présentent un risque accru d'exposition à la COVID-19 ou de maladie grave liée à la COVID-19, y compris les personnes âgées de 65 ans et plus. L'injection de rappel doit être effectuée au moins six mois après la deuxième dose Pfizer.

Qu'est-ce qu'une injection de rappel ?

Une injection de rappel est une dose supplémentaire d'un vaccin destinée aux personnes qui ont acquis une protection grâce à la vaccination, mais dont la protection peut avoir diminué au fil du temps (on parle de baisse de l'immunité).

Qui peut recevoir une injection de rappel ?

Les groupes suivants qui ont reçu la deuxième dose du vaccin Pfizer peuvent recevoir l'injection de rappel Pfizer six mois après la deuxième dose :

- + Les personnes âgées de 65 ans ou plus
- + Les personnes qui vivent dans une maison de retraite ou un autre établissement de soins de longue durée
- + Les personnes âgées de 18 à 64 ans qui présentent une pathologie sous-jacente augmentant le risque de COVID-19 sévère
- + Les personnes âgées de 18 à 64 ans qui présentent un risque accru d'exposition à

la COVID-19 en raison de leur travail (par exemple, les professionnels de la santé et les enseignants) ou de l'endroit où elles vivent ou se rendent fréquemment (par exemple, un centre d'hébergement pour les sans-abri).

Pourquoi une injection de rappel est-elle recommandée ?

Le vaccin Pfizer reste très efficace pour prévenir les maladies graves, les hospitalisations et les décès dus à la COVID-19. Cependant, certaines études montrent que la protection contre l'infection conférée par le vaccin Pfizer peut commencer à diminuer après environ six mois. Une injection de rappel peut apporter une protection supplémentaire aux personnes qui présentent un risque accru d'exposition à la COVID-19 ou de maladie grave liée à la COVID-19, en particulier en raison de la présence du variant Delta circulant dans nos communautés.

Le rappel est-il disponible pour les personnes ayant reçu le vaccin COVID-19 Moderna ou Johnson & Johnson ?

L'injection de rappel Pfizer n'est disponible que pour les personnes remplissant les conditions et ayant reçu les deux premières doses du vaccin Pfizer. Le rappel Pfizer n'est pas autorisé pour les personnes ayant reçu le vaccin Moderna ou Johnson & Johnson.

Quelles sont les pathologies médicales qui augmentent le risque de maladie grave de COVID-19 ?

Les pathologies médicales suivantes augmentent le risque de développer des symptômes graves de la COVID-19 : le diabète, les problèmes cardiaques, les maladies rénales chroniques, les maladies pulmonaires chroniques, les maladies du foie, le

cancer, la démence, le VIH et la grossesse. Pour une liste complète, consultez : [cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html](https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html)

Qui présente un risque accru d'exposition à la COVID-19 sur son lieu de travail ou dans un autre cadre ?

Les professionnels de la santé, les enseignants, le personnel des garderies et les employés des restaurants et des épiceries constituent des emplois susceptibles d'augmenter le risque d'exposition à la COVID-19. Les centres d'hébergement pour les sans-abri et les prisons sont d'autres milieux où le risque d'exposition peut être accru.

Comment savoir si j'ai besoin d'une injection de rappel ?

Si vous souhaitez savoir si vous devriez ou non recevoir une injection de rappel, posez la question à votre professionnel de la santé. Si vous avez besoin d'aide pour trouver un prestataire de santé, appelez le 311.

Les personnes qui sont enceintes, qui allaitent ou qui essaient de tomber enceintes peuvent-elles recevoir un rappel ?

Les femmes enceintes et celles qui viennent de l'être courent un risque accru de développer une maladie grave due à la COVID-19 par rapport aux personnes qui ne sont pas enceintes. Les personnes enceintes doivent être vaccinées contre la COVID-19. Si les personnes enceintes répondent aux critères d'éligibilité, elles doivent recevoir un rappel.

Quels sont les risques d'une injection de rappel ?

Pour de nombreuses personnes qui ont reçu deux doses du vaccin Pfizer, les avantages d'une injection de rappel l'emportent sur les risques. Jusqu'à présent, les réactions signalées après une troisième injection étaient semblables à celles observées après les deux premières doses. La fatigue et les douleurs au bras ont été les effets secondaires les plus fréquemment rapportés. La plupart des effets secondaires étaient légers ou modérés. Les effets secondaires sont rares, mais peuvent survenir après une injection de rappel.

L'injection de rappel contient-elle le même vaccin que les deux premières doses ?

Oui. L'injection de rappel Pfizer contient le même vaccin et la même dose que chacune des deux premières doses.

Quand dois-je recevoir une injection de rappel ?

Vous devez recevoir une injection de rappel au moins six mois après avoir reçu votre deuxième dose du vaccin Pfizer contre la COVID-19.

Si nous avons besoin d'une injection de rappel, cela signifie-t-il que les vaccins ne fonctionnent pas ?

Non. Les vaccins COVID-19 fonctionnent bien pour

prévenir les maladies graves, les hospitalisations et les décès, même contre le variant Delta qui circule largement. Toutefois, les experts en santé publique commencent à constater une légère diminution de la protection, en particulier chez certaines populations.

Je suis immunodéprimé(e) et j'ai reçu une troisième dose de vaccin. Dois-je également recevoir une injection de rappel ?

Non. Il n'est pas recommandé de recevoir une quatrième dose pour le moment. Pour obtenir des informations sur les troisièmes doses pour les personnes modérément ou gravement immunodéprimées, consultez le site [nychealthandhospitals.org/covid-19-vaccines](https://www.nychealthandhospitals.org/covid-19-vaccines).

Où puis-je obtenir une injection de rappel gratuite ?

Les rappels Pfizer sont disponibles dans les 11 hôpitaux du système NYC Health + Hospitals. Vous n'avez pas besoin d'aller au même endroit où vous avez reçu vos deux premières doses du vaccin Pfizer. Rendez-vous dans n'importe quel hôpital de soins intensifs NYC Health + Hospitals pour obtenir votre rappel, prenez rendez-vous pour un rappel à l'adresse suivante : [covid19.nychealthandhospitals.org/COVIDVaxEligibility](https://www.covid19.nychealthandhospitals.org/COVIDVaxEligibility) ou appelez le 1-877-829-4692 pour obtenir de l'aide disponible dans de nombreuses langues. Les injections de rappel Pfizer ne sont pas disponibles dans les établissements de NYC Health + Hospitals/ Gotham Health.

Puis-je recevoir une injection de rappel en même temps que d'autres vaccins (comme le vaccin contre la grippe) ?

Oui. Il n'y a pas de danger à recevoir une injection de rappel en même temps que d'autres vaccins, ou à tout moment avant ou après. Si vous n'avez pas encore été vacciné(e) contre la grippe (ou contre la COVID-19), les deux vaccins sont disponibles dans les hôpitaux de soins intensifs de NYC Health + Hospitals.

Dois-je recevoir une injection de rappel pour être complètement vacciné(e) ?

Non. On considère qu'une personne est complètement vaccinée deux semaines après la deuxième dose d'un vaccin à deux doses (comme Pfizer ou Moderna) ou deux semaines après le vaccin à dose unique de Johnson & Johnson.

Les injections de rappel seront-elles obligatoires ?

L'obligation vaccinale de l'État de New York pour les professionnels de la santé ne s'applique qu'aux première et deuxième doses. Cette obligation n'inclut pas les injections de rappel.