



SZCZEPIENIA DLA WSZYSTKICH.

COVID-19 – dawki przypominające szczepionki firmy Pfizer Najczęściej zadawane pytania

Szczepienie przypominające szczepionką przeciw COVID-19 firmy Pfizer jest zalecane kwalifikującym się do szczepienia osobom, które otrzymały drugą dawkę tej szczepionki sześć lub więcej miesięcy temu i znajdują się w grupie zwiększonego ryzyka narażenia na COVID-19 lub ciężkiego przebiegu choroby, w tym osobom w wieku 65 lat i starszym. Dawkę przypominającą należy podać po upływie sześciu lub więcej miesięcy po drugiej dawce szczepionki firmy Pfizer.

Co to jest szczepienie przypominające?

Szczepienie przypominające to dodatkowa dawka szczepionki dla osób, które uzyskały ochronę dzięki szczepieniu, ale których ochrona mogła się z czasem zmniejszyć (jest to tzw. „słabnąca odporność”).

Kto może otrzymać dawkę przypominającą?

Do otrzymania dawki przypominającej szczepionki firmy Pfizer po upływie sześciu miesięcy po podaniu drugiej dawki kwalifikują się następujące grupy, które otrzymały drugą dawkę szczepionki firmy Pfizer:

- + osoby w wieku 65 lat i starsze;
- + osoby mieszkające w domach opieki lub innych placówkach opieki długoterminowej;
- + osoby w wieku od 18 do 64 lat, mające chorobę przewlekłą, która zwiększa ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19;
- + osoby w wieku od 18 do 64 lat, które są narażone na zwiększone ryzyko zakażenia COVID-19 ze względu na wykonywaną pracę (np. pracownicy służby zdrowia i nauczyciele) lub miejsce, w którym

mieszkają lub często przebywają (np. schronisko dla bezdomnych).

Dlaczego zalecane jest szczepienie przypominające?

Szczepionka firmy Pfizer jest nadal bardzo skuteczna w zapobieganiu ciężkiemu przebiegowi choroby, hospitalizacji i zgonom powodowanym przez COVID-19. Niektóre badania wykazują jednak, że ochrona przed zakażeniem, jaką zapewnia szczepionka firmy Pfizer, może zacząć słabnąć po około sześciu miesiącach. Szczepienie przypominające może zapewnić dodatkową ochronę osobom, które są narażone na zwiększone ryzyko ekspozycji na COVID-19 lub ciężki przebieg choroby COVID-19, szczególnie w przypadku obecności wariantu Delta krążącego w naszych społecznościach.

Czy szczepienie przypominające jest dostępne dla osób, które otrzymały szczepionkę firmy Moderna lub Johnson & Johnson przeciw COVID-19?

Dawka przypominająca szczepionki firmy Pfizer jest dostępna tylko dla osób kwalifikujących się do szczepienia, które otrzymały dwie pierwsze dawki szczepionki firmy Pfizer. Dawka przypominająca szczepionki firmy Pfizer nie jest zatwierdzona do stosowania u osób, które otrzymały szczepionkę firmy Moderna lub Johnson & Johnson.

Które stany medyczne zwiększają ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19?

Do stanów medycznych zwiększających ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19 należą: cukrzyca, choroby serca, przewlekła choroba nerek, przewlekła choroba płuc, choroba wątroby, rak, demencja, HIV i ciąża. Pełna lista znajduje się na stronie: [cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html](https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html)

Kto jest narażony na zwiększone ryzyko ekspozycji na COVID-19 w swoim miejscu pracy lub innym otoczeniu?

Do osób narażonych na zwiększone ryzyko ekspozycji na COVID-19 należą pracownicy służby zdrowia, nauczyciele, pracownicy instytucji opieki dziennej oraz pracownicy restauracji i sklepów spożywczych. Inne miejsca, w których może występować zwiększone ryzyko narażenia, to schroniska dla bezdomnych i więzienia.

Skąd mam wiedzieć, czy potrzebuję szczepienia przypominającego?

W razie pytań, czy należy wykonać szczepienie przypominające, najlepiej będzie porozmawiać z pracownikiem służby zdrowia. Pomoc w znalezieniu takiej osoby można uzyskać pod numerem 311.

Czy kobiety w ciąży, karmiące piersią lub starające się zajść w ciążę mogą otrzymać dawkę przypominającą?

Kobiety w ciąży i kobiety, które niedawno były w ciąży, są narażone na zwiększone ryzyko rozwoju ciężkiej choroby wywołanej przez COVID-19 w porównaniu z osobami niebędącymi w ciąży. Kobiety w okresie ciąży powinny być szczepione przeciwko COVID-19. Jeśli kobiety w okresie ciąży spełniają kryteria kwalifikacyjne, powinny otrzymać dawkę przypominającą.

Jakie są zagrożenia związane z wykonaniem szczepienia przypominającego?

W przypadku wielu osób, które otrzymały dwie dawki szczepionki firmy Pfizer, korzyści wynikające z podania dawki przypominającej przewyższają wszelkie ryzyko. Jak dotąd reakcje zgłaszane po otrzymaniu trzeciej dawki były podobne do tych, które wystąpiły po dwóch pierwszych dawkach. Najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi było zmęczenie i ból ramienia. Większość działań niepożądanych była łagodna lub umiarkowana. Działania niepożądane są rzadkie, ale mogą wystąpić po szczepieniu przypominającym.

Czy dawka przypominająca to ta sama szczepionka, co pierwsze dwie dawki?

Tak. Dawka przypominająca szczepionki firmy Pfizer to taka sama dawka tej samej szczepionki, co dwie pierwsze dawki.

Kiedy należy wykonać szczepienie przypominające?

Szczepienie przypominające należy wykonać po upływie sześciu lub więcej miesięcy od otrzymania drugiej dawki szczepionki firmy Pfizer przeciw COVID-19.

Skoro potrzebujemy szczepienia przypominającego, czy oznacza to, że szczepionki nie działają?

Nie. Szczepionki COVID-19 dobrze sprawdzają się w zapobieganiu ciężkiemu przebiegowi choroby, hospitalizacji i zgonom, nawet w przypadku szeroko

rozpowszechnionego wariantu Delta. Jednak eksperci ds. zdrowia publicznego zaczynają dostrzegać łagodne zmniejszenie ochrony, zwłaszcza w niektórych populacjach.

Mam obniżoną odporność i podano mi trzecią dawkę szczepionki. Czy również mam wykonać szczepienie przypominające?

Nie. W chwili obecnej nie ma zaleceń dotyczących podawania czwartej dawki. Informacje na temat trzeciej dawki dla osób z umiarkowanym lub ciężkim niedoborem odporności można znaleźć na stronie nychealthandhospitals.org/covid-19-vaccines.

Gdzie mogę otrzymać darmowe szczepienie przypominające?

Szczepienia przypominające szczepionką firmy Pfizer są dostępne w 11 szpitalach systemu NYC Health + Hospitals. Nie trzeba udawać się do miejsca otrzymania dwóch pierwszych dawek szczepionki firmy Pfizer. Szczepionkę można otrzymać w dowolnej placówce NYC Health + Hospitals świadczącej intensywną opiekę medyczną, umawiając się na wizytę na stronie covid19.nychealthandhospitals.org/COVIDVaxEligibility lub dzwoniąc pod numer 1-877-829-4692, aby uzyskać pomoc w wielu językach. Szczepienia przypominające szczepionką marki Pfizer nie są dostępne w placówkach NYC Health + Hospitals / Gotham Health.

Czy mogę otrzymać szczepienie przypominające jednocześnie z innymi szczepionkami (np. szczepionką przeciw grypie)?

Tak. Podanie dawki przypominającej wraz z innymi szczepionkami lub w dowolnym momencie przed lub po nich jest bezpieczne. Dla osób, które nie otrzymały jeszcze szczepienia przeciw grypie, szczepionki przeciw grypie są również dostępne w placówkach NYC Health + Hospitals świadczących intensywną opiekę medyczną.

Czy trzeba otrzymać szczepienie przypominające, aby być w pełni zaszczepionym?

Nie. Osoby uważa się za w pełni zaszczepione po upływie dwóch tygodni po podaniu drugiej dawki szczepionki dwudawkowej (takiej jak szczepionki firmy Pfizer lub Moderna) lub dwóch tygodni po podaniu pojedynczej dawki szczepionki firmy Johnson & Johnson.

Czy szczepienia przypominające będą obowiązkowe?

W stanie Nowy Jork obowiązek szczepień pracowników służby zdrowia dotyczy tylko pierwszej i drugiej dawki. Szczepienia przypominające nie są obowiązkowe.