

## **ВАКЦИНАЦИЯ ДЛЯ ВСЕХ.**

# **Ревакцинация от COVID-19 вакциной Pfizer**

## **Часто задаваемые вопросы**

Ревакцинация от COVID-19 вакциной Pfizer рекомендована людям, которые соответствуют определенным критериям и получили вторую дозу вакцины Pfizer от COVID-19 шесть или более месяцев назад, а также подвержены более высокому риску заражения COVID-19 или риску тяжелого течения COVID-19, в том числе людям в возрасте 65 лет и старше. Ревакцинация осуществляется по истечении шести или более месяцев после получения второй дозы вакцины Pfizer.

### **Что такое ревакцинация?**

Ревакцинация – это введение дополнительной дозы вакцины людям со сформированной защитой вследствие вакцинации, которая может ослабевать со временем (это называется снижением уровня иммунитета).

### **Кто может пройти ревакцинацию?**

Следующие группы населения, которые получили вторую дозу вакцины Pfizer, могут пройти ревакцинацию вакциной Pfizer через шесть месяцев после получения второй дозы:

- + Лица в возрасте 65 лет или старше
- + Лица, проживающие в учреждениях сестринского ухода или иных учреждениях долгосрочного ухода
- + Лица в возрасте от 18 до 64 лет с фоновыми заболеваниями, подвергающимися их повышенному риску тяжелого течения

COVID-19

- + Лица в возрасте от 18 до 64 лет, которые подвержены повышенному риску воздействия COVID-19 из-за характера их трудовой деятельности (например, медицинские работники и учителя), места жительства или необходимости часто посещать отдельные места (например, ночлежки)

### **Почему рекомендуется проходить ревакцинацию?**

Вакцина Pfizer остается крайне эффективным средством профилактики тяжелого течения заболевания, госпитализации и смерти по причине COVID-19. При этом некоторые исследования показывают, что защита от заражения, обеспечиваемая вакциной Pfizer, может снижаться по истечении шести месяцев. Ревакцинация может обеспечить дополнительную защиту лицам, подверженным повышенному риску заражения COVID-19 или тяжелого течения заболевания COVID-19, особенно из-за присутствия варианта Delta, циркулирующего в наших сообществах.

### **Доступна ли ревакцинация для тех лиц, которые получили вакцину Moderna или Johnson & Johnson от COVID-19?**

Ревакцинация вакциной Pfizer предусмотрена только для людей, соответствующих определенным критериям, которые получили первые две дозы вакцины Pfizer. Ревакцинация вакциной Pfizer не одобрена для лиц, которые получили вакцину Moderna или Johnson & Johnson.

## **Какие заболевания повышают риск тяжелого течения COVID-19?**

К заболеваниям, которые повышают риск тяжелого течения COVID-19, относятся сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, хроническая болезнь почек, хроническое заболевание легких, заболевания печени, онкологические заболевания, деменция, ВИЧ и беременность. См. полный перечень по ссылке [cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html](https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html)

## **Кто подвергается повышенному риску заражения COVID-19 на рабочем месте или в другой обстановке?**

К сотрудникам, которые подвергаются повышенному риску заражения COVID-19, относятся медицинские работники, учителя, сотрудники детских садов и работники ресторанов и продовольственных магазинов. Кроме того, повышенный риск заражения характерен и для других условий, например в ночлежках и тюрьмах.

## **Как я могу узнать, нужна ли мне ревакцинация?**

Обратитесь к своему поставщику медицинских услуг с вопросом о необходимости ревакцинации. Если вам нужна помощь в поиске поставщика, позвоните по номеру 311.

## **Могут ли пройти ревакцинацию беременные, кормящие или планирующие беременность люди?**

Беременные и недавно родившие люди подвергаются повышенному риску тяжелого течения COVID-19 по сравнению с небеременными людьми. Беременным необходимо вакцинировать от COVID-19. Если беременные соответствуют критериям ревакцинации, им следует ее пройти.

## **Какие риски связаны с ревакцинацией?**

Для большинства из тех, кто получил две дозы вакцины Pfizer, польза от ревакцинации перевешивает все риски. На данный момент реакции, о которых сообщалось после третьей дозы, были аналогичны таковым при введении первых двух доз. Чаще всего сообщалось о таких побочных эффектах, как усталость и боль в руке. Большинство побочных эффектов были незначительными или умеренными. Побочные эффекты встречаются редко, но могут возникать и после ревакцинации.

## **Является ли вакцина, используемая для ревакцинации, аналогичной первым двум дозам?**

Да. Для ревакцинации Pfizer используется та же вакцина и в той же дозировке, что и в первых двух случаях.

## **Когда нужно проходить ревакцинацию?**

Вам следует пройти ревакцинацию через шесть или более месяцев после введения второй дозы вакцины Pfizer от COVID-19.

## **Если нам нужна ревакцинация, означает ли это, что вакцины не работают?**

Нет. Вакцины от COVID-19 эффективно предотвращают тяжелое течение заболевания, госпитализацию и смерть даже в случае получившего широкое распространение варианта Delta. Однако эксперты в области здравоохранения начинают отмечать незначительное снижение уровня защиты, особенно у определенных категорий населения.

## **У меня ослаблен иммунитет, и я получил(а) третью дозу вакцины. Нужно ли мне пройти ревакцинацию?**

Нет. В настоящее время отсутствуют рекомендации по получению четвертой дозы вакцины. См. информацию о третьих дозах вакцины для лиц с умеренно или значительно ослабленным иммунитетом по ссылке [nychealthandhospitals.org/covid-19-vaccines](https://www.nychealthandhospitals.org/covid-19-vaccines).

## **Где я могу пройти бесплатную ревакцинацию?**

Ревакцинация вакциной Pfizer доступна в 11 больницах NYC Health + Hospitals. Вам не нужно обращаться по тому же адресу, где вы получали первые две дозы вакцины Pfizer. Приходите в любую больницу неотложной помощи NYC Health + Hospitals для ревакцинации без предварительной записи, запишитесь на ревакцинацию по ссылке [covid19.nychealthandhospitals.org/COVIDVaxEligibility](https://www.nychealthandhospitals.org/COVIDVaxEligibility) или позвоните по номеру 1-877-829-4692, чтобы получить помощь на разных языках. Ревакцинация вакциной Pfizer не предоставляется в пунктах NYC Health + Hospitals/Gotham Health.

## **Могу ли я пройти ревакцинацию одновременно с получением других вакцин (например, от гриппа)?**

Да. Проходить ревакцинацию одновременно с получением других вакцин или в любое время до или после этого – безопасно. Если вы еще не сделали прививку от гриппа, она также доступна в больницах неотложной помощи NYC Health + Hospitals.

## **Нужна ли мне ревакцинация, чтобы меня считали полностью вакцинированным(ой)?**

Нет. Лица считаются полностью вакцинированными через две недели после получения второй дозы двухдозовой вакцины (например, Pfizer или Moderna) или через две недели после получения однодозовой вакцины Johnson & Johnson.

## **Будет ли ревакцинация обязательной?**

Указ об обязательной вакцинации медицинских работников штата Нью-Йорк касается только первой и второй доз. Указ не охватывает ревакцинацию.