

针对所有人的 疫苗接种。

Pfizer COVID-19 加强针剂

常见问题解答

Pfizer COVID-19 加强针剂适用于六个月或更长时间之前接受第二剂 Pfizer COVID-19 疫苗且暴露于 COVID-19 或严重 COVID-19 疾病的风险增加的、符合条件的人士，包括年满 65 岁的人士。加强针剂应在注射第二剂 Pfizer 疫苗六个月或更长时间之后注射。

什么是加强针剂？

加强针剂是额外一剂疫苗，适用于已通过疫苗接种建立起了防护，但这种防护可能随着时间的推移而降低（这称为免疫力减弱）的人士。

谁能获得加强针剂？

以下接种第二剂 Pfizer 疫苗的人群有资格在接种第二剂六个月后接种 Pfizer 加强针剂：

- + 年满 65 岁的人士
- + 住在疗养院或其他长期护理机构的人士
- + 有增加患上严重 COVID-19 风险的基础疾病的 18 至 64 岁人士
- + 由于从事的工作（例如，健康护理工作者和教师）或居住地或经常访问的地方（例如，无家可归者收容所）而导致暴露于 COVID-19 的风险增加的 18 至 64 岁人士

为什么建议注射加强针剂？

Pfizer 疫苗在预防因 COVID-19 引起的严重疾病、住院和死亡方面仍然非常有效。然而，一些研究表明，Pfizer 疫苗对感染的保护可能在大约六个月后开始下降。加强针剂可以为暴露于 COVID-19 或严重 COVID-19 疾病的风险增加的人士提供额外保护，尤其是德尔塔变种在我们社区中传播的情况下。

接种了 Moderna 或 Johnson & Johnson COVID-19 疫苗的人可以注射加强针剂吗？

Pfizer 加强针剂仅适用于接种了前两剂 Pfizer 疫苗的符合条件的人士。Pfizer 加强针剂未被批准用于接种了 Moderna 或 Johnson & Johnson 疫苗的人士。

哪些身体状况会增加患严重 COVID-19 疾病的风险？

导致患严重 COVID-19 的风险增加的身体状况包括糖尿病、心脏病、慢性肾病、慢性肺病、肝病、癌症、失智症、艾滋病毒和怀孕。有关完整列表，请参阅：cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html

谁在工作场所或其他环境中暴露于 COVID-19 的风险增加？

可能会增加暴露于 COVID-19 的风险的职业包括健康护理人员、教师、日间照护人员以及餐厅和杂货店的工作人员。其他可能增加暴露风险的环境包括无家可归者收容所和监狱。

我如何知道我是否需要注射加强针剂？

如果您对是否应该进行加强针剂注射有疑问，请咨询您的健康护理服务提供者。如果您需要帮助寻找服务提供者，请致电 311。

怀孕、哺乳或试图怀孕的人可以注射加强针剂吗？

与未怀孕的人相比，怀孕和最近怀孕过的人因 COVID-19 而患上严重疾病的风险更高。孕妇应接种 COVID-19 疫苗。如果孕妇符合资格标准，则应接种加强针剂。

注射加强针剂有什么风险？

对于许多接种过两剂 Pfizer 疫苗的人来说，加强针剂的益处大于任何风险。到目前为止，接种第三剂疫苗后报告的反应与前两次注射后报告的反应相似。疲倦和手臂酸痛是最常见的副作用。大多数副作用为轻度至中度。副作用很少见，但可能会在注射加强针剂后发生。

加强针剂与注射的前两剂疫苗是否相同？

是。Pfizer 加强针剂与前两剂是相同的疫苗，且剂量相同。

我何时应注射加强针剂？

您应该在接种第二剂 Pfizer COVID-19 疫苗六个月或更长时间之后注射加强针剂。

如果我们需要注射加强针剂，这是否意味着疫苗不起作用？

否。即使针对广泛传播的德尔塔变种，COVID-19 疫苗也能有效预防严重疾病、住院和死亡。然而，公共卫生专家开始看到保护效果轻微减弱，特别是在某些人群中。

我免疫功能低下，接种了第三剂疫苗。我是否也应注射加强针剂？

否。目前不建议注射第四剂。有关中度至重度免疫功能低下人群接种第三剂的信息，请访问 nychealthandhospitals.org/covid-19-vaccines。

我在哪里可以免费注射加强针剂？

Pfizer 加强针剂可在 NYC Health + Hospitals 系统的 11 家医院注射。您无需前往您接种前两剂 Pfizer 疫苗的同一地点进行注射。前往任何 NYC Health + Hospitals 急症护理医院注射加强针剂，在 covid19.nychealthandhospitals.org/COVIDVaxEligibility 安排加强针剂预约，或致电 1-877-829-4692，以多种语言提供帮助。NYC Health + Hospitals/Gotham Health 地点不提供 Pfizer 加强针剂注射。

我是否可以在接种其他疫苗（例如流感疫苗）的同时注射加强针剂？

是。在接种其他疫苗的同时或之前或之后的任何时间注射加强针剂是安全的。如果您还没有接种流感疫苗，您可以前往 NYC Health + Hospitals 急症护理医院接种两种疫苗。

我是否需要注射加强针剂才能实现充分接种？

否。在接种双剂疫苗（例如 Pfizer 或 Moderna）的第二剂两周后或接种单剂 Johnson & Johnson 疫苗两周后方即被视为已充分接种疫苗。

是否会强制要求注射加强针剂？

纽约州针对健康护理工作者的强制疫苗接种要求仅适用于第一剂和第二剂。该强制要求不包括加强针剂。