

針對所有人的 疫苗接種。

Pfizer COVID-19 加強針劑

常見問題解答

Pfizer COVID-19 加強針劑適用於六個月或更長時間之前接受第二劑 Pfizer COVID-19 疫苗且暴露於 COVID-19 或嚴重 COVID-19 疾病的風險增加的、符合條件的人士，包括年滿 65 歲的人士。加強針劑應在注射第二劑 Pfizer 疫苗六個月或更長時間之後注射。

什麼是加強針劑？

加強針劑是額外一劑疫苗，適用於已透過疫苗接種建立起了防護，但這種防護可能隨著時間的推移而降低（這稱為免疫力減弱）的人士。

誰能獲得加強針劑？

以下接種第二劑 Pfizer 疫苗的人群有資格在接種第二劑六個月後接種 Pfizer 加強針劑：

- + 年滿 65 歲的人士
- + 住在療養院或其他長期護理機構的人士
- + 有增加患上嚴重 COVID-19 風險的基礎疾病的 18 至 64 歲人士
- + 由於從事的工作（例如，健康護理工作者和教師）或居住地或經常造訪的地方（例如，無家可歸者收容所）而導致暴露於 COVID-19 的風險增加的 18 至 64 歲人士

為什麼建議注射加強針劑？

Pfizer 疫苗在預防因 COVID-19 導致的嚴重疾病、住院和死亡方面仍然非常有效。然而，一些研究表明，Pfizer 疫苗對感染的保護可能在大約六個月後開始下降。加強針劑可以為暴露於 COVID-19 或嚴重 COVID-19 疾病的風險增加的人士提供額外保護，尤其是德爾塔變種在我們社區中傳播的情況下。

接種了 Moderna 或 Johnson & Johnson COVID-19 疫苗的人可以注射加強針劑嗎？

Pfizer 加強針劑僅適用於接種了前兩劑 Pfizer 疫苗的符合條件的人士。Pfizer 加強針劑未被核准用於接種了 Moderna 或 Johnson & Johnson 疫苗的人士。

哪些身體狀況會增加患嚴重 COVID-19 疾病的風險？

導致患嚴重 COVID-19 的風險增加的身體狀況包括糖尿病、心臟病、慢性腎病、慢性肺病、肝病、癌症、失智症、愛滋病毒和懷孕。有關完整清單，請參閱：cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html

誰在工作場所或其他環境中暴露於 COVID-19 的風險增加？

可能會增加暴露於 COVID-19 的風險的職業包括健康護理人員、教師、日間照護人員以及餐廳和雜貨店的工作人員。其他可能增加暴露風險的環境包括無家可歸者收容所和監獄。

我如何知道我是否需要注射加強針劑？

如果您對是否應該進行加強針劑注射有疑問，請諮詢您的健康護理服務提供者。如果您需要幫助尋找服務提供者，請致電 311。

懷孕、哺乳或嘗試懷孕的人可以注射加強針劑嗎？

與未懷孕的人相比，懷孕和最近懷孕過的人因 COVID-19 而患上嚴重疾病的風險更高。孕婦應接種 COVID-19 疫苗。如果孕婦符合資格標準，則應接種加強針劑。

注射加強針劑有什麼風險？

對於許多接種過兩劑 Pfizer 疫苗的人來說，加強針劑的益處大於任何風險。到目前為止，接種第三劑疫苗後報告的反應與前兩次注射後報告的反應相似。疲倦和手臂酸痛是最常見的副作用。大多數副作用為輕度至中度。副作用很少見，但可能會在注射加強針劑後發生。

加強針劑與注射的前兩劑疫苗是否相同？

是。Pfizer 加強針劑與前兩劑是相同的疫苗，且劑量相同。

我何時應注射加強針劑？

您應該在接種第二劑 Pfizer COVID-19 疫苗六個月或更長時間之後注射加強針劑。

如果我們需要注射加強針劑，這是否意味著疫苗不起作用？

否。即使針對廣泛傳播的德爾塔變種，COVID-19 疫苗也能有效預防嚴重疾病、住院和死亡。然而，公共衛生專家開始看到保護效果輕微減弱，特別是在某些人群中。

我免疫功能低下，接種了第三劑疫苗。我是否也應注射加強針劑？

否。目前不建議注射第四劑。有關中度至重度免疫功能低下人群接種第三劑的資訊，請瀏覽 nychealthandhospitals.org/covid-19-vaccines。

我在哪裡可以免費注射加強針劑？

Pfizer 加強針劑可在 NYC Health + Hospitals 系統的 11 家醫院注射。您無需前往您接種前兩劑 Pfizer 疫苗的地點進行注射。前往任何 NYC Health + Hospitals 急症護理醫院注射加強針劑，在 covid19.nychealthandhospitals.org/COVIDVaxEligibility 安排加強針劑預約，或致電 1-877-829-4692，以多種語言提供幫助。NYC Health + Hospitals/Gotham Health 地點不提供 Pfizer 加強針劑注射。

我是否可以在接種其他疫苗（例如流感疫苗）的同時注射加強針劑？

是。在接種其他疫苗的同時或之前或之後的任何時間注射加強針劑是安全的。如果您還沒有接種流感疫苗，您可以前往 NYC Health + Hospitals 急症護理醫院接種兩種疫苗。

我是否需要注射加強針劑才能實現充分接種？

否。在接種雙劑疫苗（例如 Pfizer 或 Moderna）的第二劑兩週後或接種單劑 Johnson & Johnson 疫苗兩週後即可被視為已充分接種疫苗。

是否會強制要求注射加強針劑？

紐約州針對健康護理工作者的強制疫苗接種要求僅適用於第一劑和第二劑。該強制要求不包括加強針劑。