

VACCINATIONS POUR TOUS

Injections de rappel du vaccin contre la COVID-19

Foire aux questions

L'injection de rappel du vaccin contre la COVID-19 est recommandée pour les personnes admissibles qui ont reçu leur deuxième dose du vaccin Pfizer ou Moderna contre la COVID-19 il y a six mois ou plus et qui présentent un risque accru d'exposition à la COVID-19 ou de maladie grave liée à la COVID-19, notamment les personnes âgées de 65 ans et plus ou celles qui ont reçu la dose unique du vaccin Johnson & Johnson (J&J) il y a deux mois ou plus et qui sont âgées de 18 ans et plus.

Qu'est ce qu'une injection de rappel ?

Une injection de rappel est une dose supplémentaire d'un vaccin après avoir terminé une série de vaccins. Elle est utilisée pour renforcer l'immunité contre le virus, car la protection peut avoir diminué au fil du temps (on parle d'immunité décroissante).

Qui peut recevoir une injection de rappel ?

Six mois après avoir reçu la deuxième dose des vaccins Pfizer ou Moderna, les groupes suivants peuvent recevoir une injection de rappel :

- + Les personnes âgées de 65 ans ou plus
- + Les personnes qui vivent dans une maison de retraite ou un autre établissement de soins de longue durée
- + Les personnes âgées de 18 à 64 ans qui présentent une affection sous-jacente augmentant le risque de contracter une COVID-19 grave

- + Les personnes âgées de 18 à 64 ans qui présentent un risque accru d'exposition à la COVID-19 en raison de leur travail (par exemple, les travailleurs de la santé et les enseignants) ou de l'endroit où elles vivent ou se rendent fréquemment (par exemple, un refuge pour sans-abri)

Deux mois après avoir reçu la dose unique du vaccin J&J, les personnes âgées de 18 ans ou plus peuvent recevoir une injection de rappel

Pourquoi une injection de rappel est-elle recommandée ?

Les vaccins contre la COVID-19 sont encore très efficaces pour prévenir les maladies graves, les hospitalisations et les décès dus à la COVID-19. Toutefois, certaines études montrent que la protection contre l'infection conférée par les vaccins Pfizer ou Moderna peut commencer à diminuer après environ six mois, ou après environ deux mois pour le vaccin J&J. Une injection de rappel peut apporter une protection supplémentaire aux personnes qui présentent un risque accru d'exposition à la COVID-19 ou de maladie grave liée à la COVID-19, en particulier avec la présence de la variante Delta qui circule dans nos communautés.

Quelles sont les conditions médicales qui augmentent le risque de maladie grave due à la COVID-19 ?

Les conditions médicales qui augmentent le risque de maladie grave liée à la COVID-19 sont le diabète, les problèmes cardiaques, les maladies rénales chroniques, les maladies pulmonaires chroniques, les maladies du foie, le cancer, la démence, le VIH et la grossesse. Pour obtenir une liste complète, consultez : [cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html](https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html)

Qui présente un risque accru d'exposition à la COVID-19 sur son lieu de travail ou dans un autre cadre ?

Les emplois qui peuvent augmenter le risque d'exposition à la COVID-19 comprennent les travailleurs de la santé, les enseignants, le personnel des garderies et les employés des restaurants et des épiceries. Les foyers pour sans-abri et les prisons sont d'autres milieux susceptibles de présenter un risque accru d'exposition.

Comment savoir si j'ai besoin d'une injection de rappel ?

Consultez votre prestataire de soins de santé si vous avez des questions sur la nécessité d'une injection de rappel. Si vous avez besoin d'aide pour trouver un prestataire, appelez le 311 ou le 212-COVID-19 (212-268-4319) et parlez avec un membre du personnel infirmier pour savoir si vous êtes admissible.

Les femmes enceintes, qui allaitent ou qui essaient de tomber enceinte peuvent-elles recevoir une injection de rappel ?

Les femmes enceintes et celles qui l'ont été récemment courent un risque accru de développer une maladie grave due à la COVID-19 par rapport aux autres femmes. Les femmes enceintes doivent être vaccinées contre la COVID-19. Si les femmes enceintes répondent aux critères d'admissibilité, elles doivent recevoir une injection de rappel.

Quels sont les risques liés à l'administration d'une injection de rappel ?

Pour de nombreuses personnes qui ont reçu deux doses des vaccins Pfizer ou Moderna ou une seule dose du vaccin J&J, les avantages d'une injection de rappel l'emportent sur les risques. Jusqu'à présent, les réactions signalées après une injection de rappel étaient similaires à celles observées après les premières doses. La fatigue et les douleurs au bras sont les effets secondaires les plus fréquemment signalés. La plupart des effets secondaires étaient légers ou modérés.

L'injection de rappel est-elle le même vaccin que les deux premières doses ?

Oui. L'injection de rappel est le même vaccin que chacune des deux premières doses de Pfizer ou Moderna, ou que l'unique dose de J&J. Toutefois, la dose du rappel Moderna est deux fois moins importante que celle administrée pour les deux premières doses.

La marque de mon injection de rappel doit-elle être la même que celle du vaccin que j'ai reçu initialement ?

Les personnes vaccinées doivent essayer de recevoir le même vaccin que celui qu'elles ont reçu initialement comme rappel, mais elles ont le choix de passer à l'un des deux autres types de vaccin.

Quand dois-je recevoir une injection de rappel ?

Vous devez recevoir une injection de rappel six mois ou plus après avoir reçu votre deuxième dose des vaccins Pfizer ou Moderna contre la COVID-19, si vous y êtes admissible, ou deux mois ou plus après avoir reçu la dose unique du vaccin J&J contre la COVID-19.

Si nous avons besoin d'une injection de rappel, cela signifie-t-il que les vaccins ne sont pas efficaces ?

Non. Les vaccins contre la COVID-19 sont efficaces

pour prévenir les maladies graves, les hospitalisations et les décès, même contre le variant Delta qui circule librement. Cependant, les experts en santé publique commencent à constater une légère diminution de la protection, en particulier dans certaines populations.

Je suis immunodéprimé et j'ai reçu une troisième dose de vaccin. Dois-je également recevoir une injection de rappel ?

Les personnes modérément et gravement immunodéprimées âgées de 18 ans et plus qui ont reçu une première série de vaccins ARNm contre la COVID-19 et une dose supplémentaire de vaccin ARNm peuvent recevoir une seule injection de rappel contre la COVID-19 (Pfizer-BioNTech, Moderna ou J&J) au moins 6 mois après avoir reçu leur troisième dose de vaccin ARNm.

Où puis-je obtenir une injection de rappel gratuite ?

Les injections de rappel Pfizer et J&J sont disponibles dans les 11 hôpitaux du système NYC Health + Hospitals. Les injections de rappel Moderna sont disponibles dans tous les sites de NYC Health + Hospitals/Gotham Health. Vous n'avez pas besoin de vous rendre au même endroit où vous avez reçu vos deux premières doses du vaccin Pfizer ou Moderna ou une seule dose du vaccin J&J. Rendez-vous dans n'importe quel hôpital de soins intensifs NYC Health + Hospitals ou site NYC Health + Hospitals/Gotham Health pour votre injection de rappel ou appelez le 1-877-829-4692 pour obtenir de l'aide dans plusieurs langues.

Puis-je recevoir une injection de rappel en même temps que d'autres vaccins (comme le vaccin contre la grippe) ?

Oui. Vous pouvez vous faire vacciner en toute sécurité en même temps que d'autres vaccins, ou n'importe quand avant ou après. Si vous n'avez pas encore reçu votre vaccin contre la grippe, les deux sont disponibles dans les hôpitaux de soins intensifs de NYC Health + Hospitals.

Ai-je besoin d'une injection de rappel pour être complètement vacciné ?

Non. Les personnes sont considérées comme totalement vaccinées deux semaines après la deuxième dose d'un vaccin à deux doses (comme Pfizer ou Moderna) ou deux semaines après le vaccin J&J à dose unique.

Les injections de rappel seront-elles obligatoires ?

Le mandat de vaccination de l'État de New York pour les travailleurs de la santé ne s'applique qu'aux première et deuxième doses. Le mandat n'inclut pas les injections de rappel.

Les injections de rappel sont-elles recommandées pour les enfants ?

Non. À l'heure actuelle, Pfizer est le seul vaccin autorisé pour les enfants âgés de 5 à 11 ans. Les personnes âgées de 5 à 17 ans ne sont actuellement pas admissibles aux injections de rappel.