

## 모두를 위한 백신접종

# COVID-19 부스터 샷

## 자주 묻는 질문

COVID-19 부스터 샷은 Pfizer 또는 Moderna COVID-19 백신의 2차 접종을 6개월 이상 이전에 마쳤고 65세 이상이거나 2개월 전에 Johnson & Johnson(J&J) 백신을 1회 접종했으며 18세 이상인 개인을 포함하여 COVID-19 또는 중증 질환에 대한 노출 위험이 큰 사람들에게 권장됩니다.

### 부스터 샷이란 무엇인가요?

부스터 샷은 백신 접종을 마친 후 추가적으로 백신을 접종하는 것이며 시간이 지나 백신 효과가 감소한 경우 면역력을 높이는 데 사용됩니다.

### 부스터 샷은 누가 접종할 수 있나요?

다음 그룹은 Pfizer 또는 Moderna 백신의 2차 접종을 마치고 6개월이 경과한 후에 부스터 샷을 접종할 수 있습니다.

- + 65세 이상
- + 요양원 또는 기타 장기 치료 시설에 거주하는 사람
- + 중증 COVID-19의 위험이 있는 기저질환을 가진 18세-64세의 개인
- + 18세-64세의 개인으로서 업무상 COVID-19 바이러스에 노출될 위험이 높거나(예: 의료 제공자 및 교사) 거주지나 자주 방문하는 장소 때문에 위험이 높은 사람(예: 노숙자 보호소)

J&J 백신을 1회 접종하고 2개월이 경과한 18세 이상의 개인은 부스터 샷을 접종할 수 있습니다.

### 부스터 샷을 권장하는 이유는 무엇인가요?

COVID-19 백신은 COVID-19로 인한 심각한 질병, 입원, 사망을 방지하는 효과가 매우 높습니다. 하지만 Pfizer 또는 Moderna 백신의 감염 예방 효과는 6개월이 경과한 후 또는 J&J 백신의 경우 접종하고 2개월이 경과한 후에 감소하기 시작할 수 있다는 연구 결과가 있습니다. 부스터 샷은 특히 델타 변이가 유행하는 장소에서 COVID-19 바이러스의 노출 또는 중증 COVID-19의 위험이 큰 사람들에게 추가적인 예방 효과를 제공할 수 있습니다.

### 중증 COVID-19의 위험을 높이는 의학적 질환은 어떤 것인가요?

중증 COVID-19의 위험을 높이는 질환에는 당뇨병, 심장 질환, 만성 신부전증, 만성 폐질환, 간 질환, 암, 치매, HIV, 임신 등이 포함됩니다. 전체 목록은 다음을 확인하십시오.  
링크: [cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html](https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html)

### 직장이나 다른 장소에서 COVID-19 바이러스에 대한 노출 위험이 큰 직업에는 어떤 것이 있나요?

COVID-19 바이러스에 대한 노출 위험이 큰 직업에는 의료 제공자, 교사, 보육 시설 직원, 레스토랑과 식료품점 직원 등이 포함됩니다. 또한 노숙자 보호소나 교정시설과 같은 장소도 바이러스 노출 위험이 클 수 있습니다.

### 내가 부스터 샷을 접종해야 하는지 어떻게 알 수 있나요?

부스터 샷 접종 여부는 담당 의료 제공자와 상담하도록 하십시오. 의료 제공자를 찾는 데 도움이 필요하다면 311 번으로 전화하거나 212-COVID-19(212-268-4319)번으로 전화하여 접종 여부에 대해 간호사와 상담하십시오.

**임산부, 수유 중인 산모, 임신 예정자들도 부스터 샷을 접종할 수 있나요?**

임산부 및 최근에 임신한 사람들은 임신하지 않은 여성보다 COVID-19로 인해 중증 질환이 발생할 위험이 높습니다. 임산부는 COVID-19 백신 접종을 해야 합니다. 임산부가 자격 기준에 부합한다면 부스터 샷을 접종해야 합니다.

**부스터 샷을 접종할 경우 어떤 위험이 있을 수 있나요?**

Pfizer 또는 Moderna 백신을 2차까지 접종했거나 J&J를 1회 접종한 사람들은 위험보다 장점이 더 많습니다. 지금까지 부스터 샷을 접종한 후 보고된 반응은 최초 접종 후의 반응과 유사합니다. 피로감과 팔의 통증이 가장 일반적으로 보고된 부작용이었으며, 대부분의 부작용은 경미하거나 중간 정도였습니다.

**부스터 샷은 1차 및 2차 접종과 동일한 백신인가요?**

그렇습니다. 부스터 샷은 Pfizer 또는 Moderna의 처음 2회 접종 용량이나 J&J의 1회 접종 용량과 동일합니다. Moderna 부스터 샷의 용량은 처음 2회 접종한 용량의 절반 정도입니다.

**부스터 샷의 브랜드는 처음에 접종한 백신과 동일한 브랜드여야 하나요?**

접종을 마친 사람들은 가능하다면 부스터 샷이 처음에 접종한 백신과 동일한 것으로 접종하도록 해야 하지만 다른 백신으로 전환할 수도 있습니다.

**부스터 샷은 언제 접종해야 하나요?**

부스터 샷은 Pfizer 또는 Moderna COVID-19 백신의 2차 접종을 하고 6개월 후, 또는 J&J COVID-19 백신을 1회 접종하고 2개월 후에 접종해야 합니다.

**부스터 샷이 필요한 이유는 백신이 효과가 없어서 그런가요?**

아닙니다. COVID-19 백신은 유행하는 델타 변이를 포함한 심각한 질병, 입원, 사망 등을 예방하는 데 매우 효과적입니다. 하지만 공중보건 전문가들은 특정 집단에서 예방 효과가 조금 감소하는 것을 인식하기 시작했습니다.

**저는 면역력이 약해서 3차 백신접종을 했습니다. 그래도 부스터 샷을 접종해야 할까요?**

mRNA COVID-19 백신 접종을 완료했으며 추가로 mRNA 백신을 접종한 18세 이상의 개인으로서 중등도 이상으로 면역력이 약화된 사람은 3차 mRNA 백신을 접종하고 6개월이 경과된 후 COVID-19 부스터 샷(Pfizer-BioNTech, Moderna 또는 J&J)을 1회 접종할 수 있습니다.

**부스터 샷은 어디에서 무료로 접종할 수 있나요?**

Pfizer 및 J&J 부스터 샷은 NYC Health + Hospitals 소속의 11개 병원에서 접종할 수 있습니다. Moderna 부스터 샷은 모든 NYC Health + Hospitals/Gotham Health 시설에서 접종할 수 있습니다. Pfizer 또는 Moderna 백신을 처음에 2회 접종한 곳 또는 J&J 백신을 1회 접종한 곳과 동일한 곳에서 접종할 필요는 없습니다. 부스터 샷 접종을 위해 모든 NYC Health + Hospitals 급성 치료 병원이나 NYC Health + Hospitals/Gotham Health 시설을 직접 방문해 주십시오. 다양한 언어로 지원이 필요하시면 1-877-829-4692번으로 전화해 주십시오.

**독감 백신 같은 다른 백신과 동시에 부스터 샷을 접종할 수 있나요?**

그렇습니다. 다른 백신과 동시에 또는 직전이나 직후에 부스터 샷을 접종해도 안전합니다. 독감 백신을 아직 접종하지 않았다면 NYC Health + Hospitals 외래 진료 병원에서 접종할 수 있습니다.

**완전히 백신 효과를 보려면 부스터 샷을 접종해야 하나요?**

아니요, 2회 접종하는 백신(Pfizer 또는 Moderna) 또는 1회 접종하는 J&J 백신 접종을 마치고 2주 후면 백신 접종을 완료한 것으로 간주합니다.

**부스터 샷 접종은 의무인가요?**

뉴욕주 의료 제공자의 백신 의무는 1차 및 2차 접종에만 해당됩니다. 따라서 필수 접종에 부스터 샷은 포함되지 않습니다.

**아이들에게도 부스터 샷을 권장하나요?**

아닙니다. 현재 5-11세 아동에게는 Pfizer만 접종 승인이 되었습니다. 5-17세의 아동은 현재 부스터 샷을 접종할 수 없습니다.