

VACCINATIONS POUR TOUS

- + **Vaccins contre la grippe**
- + **Doses pédiatriques Pfizer**
 - Première et deuxième doses
 - Un tiers de la concentration de la dose pour adulte

Disponible dans tous nos hôpitaux

Avec la saison de la grippe qui vient s'ajouter à la COVID-19, plus que jamais, il est important de se protéger et de protéger ses enfants contre la maladie

La COVID-19 et les vaccins contre la grippe sont sûrs et très efficaces pour réduire le risque de maladie, d'hospitalisation et même de décès.

Vos enfants peuvent recevoir gratuitement le vaccin contre la COVID-19 et le vaccin contre la grippe en même temps.

Renseignez-vous sur le vaccin qui vous convient le mieux. Scannez le code QR ou appelez le **1-844-NYC-4NYC** (1-844-692-4692).

En savoir plus sur les vaccins contre la COVID-19



En savoir plus sur les vaccins contre la grippe



Qui doit se faire vacciner contre la grippe et la COVID-19 ?

Vaccin antigrippal

Toute personne âgée de six mois et plus doit se faire vacciner contre la grippe saisonnière chaque année, en particulier :

- + Les enfants de moins de 2 ans
- + Les personnes âgées de plus de 65 ans
- + Les femmes enceintes ou celles qui ont récemment accouché
- + Les personnes atteintes de maladies telles que le diabète, l'asthme, les cardiopathies ou le VIH
- + Les travailleurs essentiels notamment les professionnels de la santé et les soignants des personnes présentant un risque accru de contracter une maladie. Les personnes s'occupant au quotidien des enfants, en particulier des nourrissons de moins de six mois, doivent également se faire vacciner contre la grippe.

Vaccin contre la COVID-19

La plupart des gens peuvent désormais recevoir le vaccin contre la COVID-19 :

- + Les enfants âgés de 5 à 11 ans peuvent recevoir deux doses pédiatriques (un tiers de la dose) du médicament Pfizer-BioNTech
- + Les personnes de 12 ans et plus peuvent recevoir deux doses du vaccin Pfizer-BioNTech.
- + Les personnes âgées de 18 ans et plus peuvent recevoir deux doses du vaccin Moderna, ou une dose du vaccin Johnson & Johnson/Janssen.

Troisième dose du vaccin Pfizer ou Moderna contre la COVID-19

Les troisièmes doses sont disponibles pour les personnes qui ont reçu leur deuxième dose de vaccin contre la COVID-19 il y a au moins 28 jours, et dont le système immunitaire est affaibli par une maladie ou un traitement. Il peut s'agir de :

- + Traitement actif contre le cancer
- + Transplantation d'organe et médicaments visant à réduire la vigueur du système immunitaire
- + Greffe de cellules souches au cours des 2 dernières années
- + Immunodéficience primaire modérée ou grave
- + VIH avancé ou non traité
- + Traitement actif avec une dose élevée de corticostéroïdes ou d'autres médicaments qui affaiblissent le système immunitaire de façon modérée ou sévère

Vous devez avoir 12 ans ou plus pour recevoir la 3e dose de Pfizer et 18 ans ou plus pour recevoir la 3e dose de Moderna. Les troisièmes doses ne sont pas recommandées pour la plupart des personnes atteintes de maladies telles que le diabète, une maladie cardiaque ou pulmonaire.

Injection de rappel du vaccin contre la COVID-19 - Personnes ayant reçu les vaccins Pfizer et Moderna

Des injections de rappel sont disponibles pour les personnes admissibles suivantes, si elles ont reçu deux doses du vaccin Pfizer ou Moderna il y a au moins six mois :

- + Les personnes âgées de 65 ans ou plus
- + Les personnes âgées de 18 à 64 ans qui ont une maladie sous-jacente ou un risque plus élevé d'exposition à la COVID-19 en raison de leur travail (par exemple, les travailleurs de la santé) ou de l'endroit où elles vivent ou se rendent fréquemment (par exemple, un refuge pour sans-abri).
- + Les personnes qui vivent dans une maison de retraite ou un autre établissement de soins de longue durée

Les personnes qui ont reçu deux injections du vaccin Pfizer ou Moderna doivent essayer d'obtenir le même vaccin pour leur rappel, mais ont le choix de passer à l'un des trois types de vaccins autorisés aux États-Unis.

Injection de rappel du vaccin contre la COVID-19 - Bénéficiaires du vaccin Johnson & Johnson

Toute personne âgée de 18 ans ou plus ayant reçu le vaccin unidose Johnson & Johnson il y a au moins deux mois peut maintenant recevoir une injection de rappel de l'un des trois types de vaccins autorisés aux États-Unis. Si vous ne savez pas quel type de vaccin vous devez recevoir, parlez-en à votre prestataire de soins de santé ou au personnel clinique d'un site de vaccination.