

為所有人 接種疫苗

- + 流感疫苗
- + 兒童 Pfizer 疫苗
 - 第一劑和第二劑
 - 成人疫苗的三分之一劑量

我們的任何一家醫院都可以提供

隨著流感季節的到來以及 COVID-19 疫情的持續，保護自己和孩子遠離疾病比以往任何時候都更重要。

COVID-19 和流感疫苗能安全高效地減少患病、住院，甚至是死亡的風險。

您的孩子可以同時接種 COVID-19 疫苗和流感疫苗，無需自付費用。

瞭解更多有關哪種疫苗適合你的資訊。
掃描二維碼或致電 **1-844-NYC-4NYC**
(1-844-692-4692)。

瞭解更多有關
COVID-19 疫苗
的資訊



瞭解更多有關流
感疫苗的資訊



哪些人應該接種流感疫苗和 COVID-19 疫苗？

流感疫苗

年滿 6 個月及以上的所有人士每年都應該接種季節性流感疫苗，特別是以下人群：

- + 2 歲以下的兒童
- + 65 歲以上的人群
- + 孕婦或近期分娩的婦女
- + 患有糖尿病、哮喘、心臟病或愛滋病等疾病的人士
- + 必要服務工作者，包括醫療保健工作者和患病風險較高人士的護理人員。照顧兒童（特別是 6 個月以下的嬰兒）的人士也應接種流感疫苗。

COVID-19 疫苗

大多數人現在都符合條件接種 COVID-19 疫苗：

- + 5 至 11 歲的兒童可以接種兩劑兒童（三分之一劑量）Pfizer-BioNTech 疫苗
- + 12 歲及以上的人士可接種兩劑 Pfizer-BioNTech 疫苗
- + 18 歲及以上的人士可接種兩劑 Moderna 疫苗，或一劑 Johnson & Johnson/Janssen 疫苗

第 3 劑 Pfizer 或 Moderna COVID-19 疫苗

至少 28 天前接種過第二劑 COVID-19 疫苗，並且由於某種疾病或治療而導致免疫力下降的人士可以接種第三劑。包括以下情形：

- + 正在接受癌症的積極治療
- + 接受了器官移植和使用會降低免疫系統功能的藥物
- + 過去 2 年內進行過幹細胞移植
- + 患有中度或嚴重原發性免疫缺陷
- + 患有晚期愛滋病或愛滋病未經治療
- + 正在使用大劑量的皮質類固醇或其他中度或重度削弱免疫系統的藥物治療

您必須年滿 12 歲或以上才能接種第 3 劑 Pfizer 疫苗，年滿 18 歲或以上才能接種第 3 劑 Moderna 疫苗。對於大多數患有其他疾病（如糖尿病、心臟、肺部疾病）的人來說，不建議接種第三劑。

COVID-19 加強劑 – Pfizer 和 Moderna 疫苗接種者

如果符合以下條件的人士在至少 6 個月前接種了兩劑 Pfizer 或 Moderna 疫苗，就可以接種加強劑：

- + 年滿 65 歲或以上的人士
- + 18 至 64 歲的人士，由於患有基礎疾病，或因他們的工作（例如醫護人員）或他們居住或經常去的地方（例如無家可歸者收容所）而有較高的風險感染 COVID-19
- + 住在療養院或其他長期護理機構的人士

接種了兩劑 Pfizer 或 Moderna 疫苗的人應儘量接種相同的疫苗作為加強劑，但也可以選擇改種獲得美國授權的三種疫苗中的任意一種。

COVID-19 加強劑 – Johnson & Johnson 疫苗接種者

任何年滿 18 歲或以上、至少在兩個月前接種過單劑 Johnson & Johnson 疫苗的人士，現在都可以接種獲得美國授權的三種疫苗中的任意一種作為加強劑。如果您不確定應該接種哪種疫苗，請與您的醫療護理提供者或疫苗接種點的臨床工作人員討論。

NYC Health + Hospitals/Gotham Health 接種點僅提供 Moderna 疫苗。如果想知道在哪裡可以接種 Pfizer 或 J&J 疫苗，請瀏覽我們的網站：nychealthandhospitals.org。