

SZCZEPIENIA DLA WSZYSTKICH

- + Szczepienia przeciw grypie
- + Szczepionki firmy Moderna przeciw COVID-19
 - Pierwsza i druga dawka
 - Trzecie dawki
 - Dawki przypominające

Dostępne tutaj dla wszystkich kwalifikujących się

W związku z tym, że sezon COVID-19 i grypy występują razem, jest ważniejsze niż kiedykolwiek, aby chronić siebie i swoich bliskich przed zachorowaniem.

Szczepienia przeciwko COVID-19 i grypie są bezpieczne oraz niezwykle skuteczne w zmniejszaniu ryzyka zachorowania, hospitalizacji czy nawet śmierci.

Możesz otrzymać szczepienie przeciwko COVID-19 i grypie w tym samym momencie bez dodatkowych kosztów dla Ciebie.

Dowiedz się więcej o tym, która szczepionka jest odpowiednia dla Ciebie. Zeskanuj kod QR lub zadzwoń pod numer **1-844-NYC-4NYC** (1-844-692-4692).

Dowiedz się więcej
o szczepieniach
przeciwko
COVID-19



Dowiedz się więcej
o szczepieniach
przeciwko
grypie



Kto powinien się zaszczepić przeciw grypie i COVID-19?

Szczepionka przeciw grypie

Każda osoba w wieku sześciu miesięcy lub starsza powinna co roku zaszczepić się przeciwko grypie sezonowej, zwłaszcza:

- + dzieci poniżej 2 roku życia;
- + osoby w wieku powyżej 65 lat;
- + kobiety, które są w ciąży lub niedawno rodziły;
- + osoby ze schorzeniami takimi, jak cukrzyca, astma, choroby serca lub HIV;
- + niezbędni pracownicy, w tym pracownicy służby zdrowia i opiekunowie osób z grupy podwyższonego ryzyka zachorowania. Przeciwko grypie powinny zaszczepić się również osoby opiekujące się dziećmi, zwłaszcza niemowlętami poniżej szóstego miesiąca życia.

Szczepionka przeciw COVID-19

Obecnie do otrzymania szczepionki przeciw COVID-19 kwalifikuje się większość osób:

- + osoby w wieku 5-11 lat mogą otrzymać dwie dawki dziecięce (jedna trzecia mocy) szczepionki firmy Pfizer-BioNTech;
- + osoby w wieku 12 lat i starsze mogą otrzymać dwie dawki szczepionki firmy Pfizer-BioNTech;
- + osoby w wieku 18 lat i starsze mogą otrzymać dwie dawki szczepionki firmy Moderna lub jedną dawkę szczepionki firmy Johnson & Johnson/Janssen.

Trzecia dawka szczepionki firmy Pfizer lub Moderna przeciw COVID-19

Trzecia dawka jest dostępna dla osób, które otrzymały drugą dawkę szczepionki COVID-19 co najmniej 28 dni temu i mają osłabiony układ odpornościowy z powodu choroby lub leczenia. Mogą to być:

- + aktywne leczenie raka;
- + przeszczep narządów i leki zmniejszające siłę działania układu odpornościowego;
- + przeszczep komórek macierzystych w ciągu ostatnich 2 lat;
- + umiarkowany lub ciężki pierwotny niedobór odporności;
- + zaawansowany lub nieleczony HIV;
- + aktywne leczenie dużymi dawkami kortykosteroidów lub innych leków, które umiarkowanie lub silnie osłabiają działanie układu odpornościowego.

Aby otrzymać trzecią dawkę szczepionki firmy Pfizer, należy mieć ukończone 12 lat. Przy trzeciej dawce szczepionki firmy Moderna, to 18 lat. Trzecia dawka nie jest zalecana w przypadku większości osób z innymi schorzeniami, takimi jak cukrzyca, choroby serca lub płuc.

Dawka przypominająca COVID-19 - osoby otrzymujące szczepionki firm Pfizer i Moderna

Każdy w wieku 16 lat lub więcej, kto przyjął drugą dawkę szczepionki przeciw COVID-19 firm Pfizer lub Moderna przynajmniej sześć miesięcy temu, powinien otrzymać dawkę przypominającą.

Osoby, które otrzymały dwie dawki szczepionki Pfizer lub Moderna, powinny postarać się otrzymać szczepionkę tej samej firmy w ramach dawki przypominającej, ale mają prawo wybrać spośród trzech rodzajów szczepionek dopuszczonych w Stanach Zjednoczonych.

Osoby w wieku 16-17 lat, które otrzymały podstawową serię szczepień firmy Pfizer ponad sześć miesięcy temu, kwalifikują się do przyjęcia dawki przypominającej jedynie szczepionki firmy Pfizer. Osoby w wieku 5-15 lat nie kwalifikują się obecnie do przyjęcia dawki przypominającej.

Dawka przypominająca COVID-19 - osoby otrzymujące szczepionki firmy Johnson & Johnson

Każdy w wieku 18 lat lub więcej, kto przyjął jednodawkową szczepionkę przeciw COVID-19 przynajmniej dwa miesiące temu, powinien otrzymać dawkę przypominającą. Dawka przypominająca może być dowolną z trzech szczepionek dopuszczonych w Stanach Zjednoczonych. Jeśli nie masz pewności, którą szczepionkę należy przyjąć, porozmawiaj ze swoim dostawcą usług medycznych lub personelem w placówce szczepiennej.