

為所有人接種疫苗

COVID-19 疫苗 - 適用於免疫力低下者的 第三劑 常見問題解答

為什麼需要接種第三劑 COVID-19 疫苗？

第三劑疫苗可提供額外的 COVID-19 免疫保護。截至 2021 年 8 月 16 日，我們只建議某些患有嚴重疾病或因接受治療而導致免疫系統較弱的人群接種第三劑疫苗。因為他們不能對疫苗作出足夠強的免疫反應，所以如果其他人只需接種兩劑的話，他們還需要再額外接種一劑。

哪些人有資格接種第三劑 COVID-19 疫苗？

您必須滿足以下三個條件：

- + 年齡在 12 歲或以上。
- + 至少在 28 天前接種了前兩劑 Pfizer 或 Moderna 疫苗。
- + 患有中度到重度的免疫力低下。

「免疫力低下」意味著什麼？

免疫力低下者是指那些患有疾病或因正在服用藥物而導致免疫系統較弱，從而更容易感染病毒的人群。他們是 COVID-19 重症的高危人群。

中度到重度免疫力低下人群包括：

- + 目前正在接受癌症治療（如化學療法）的人群
- + 目前正在接受大劑量的皮質類固醇治療（ $\geq 20\text{mg}$ 強體松或類似藥物），或正在服用削弱自身免疫反應的藥物
- + 接受過器官移植，目前正在接受免疫抑制療法的人群
- + 在過去兩年接受過幹細胞移植的人群
- + HIV 感染晚期或未接受治療的人群
- + 因其他原因（如 DiGeorge 症候群或 Wiskott-Aldrich 症候群）而導致中度或重度免疫力低下的人群

接種第三劑疫苗是否安全？

美國食品及藥物管理局 (Food and Drug Administration, FDA)、疾病控制與預防中心 (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) 以及獨立專家均已明確表示，接種第三劑疫苗的好處大於任何已知或潛在風險。

我什麼時候可以接種第三劑疫苗？

您應該在接種第二劑疫苗的至少四週之後再接種第三劑疫苗。只要您接種過第二劑疫苗，之後無論過了多久，您都可以接種第三劑疫苗。

我可以在哪裡接種第三劑疫苗？

您可以前往任何 NYC Health + Hospital 機構以及全市其他接種點接種第三劑疫苗。您並非必需前往前兩次接種疫苗的接種點接種第三劑疫苗。

如需查找疫苗接種點，請前往 nyc.gov/vaccinefinder 或致電 877-VAX-4-NYC (877-829-4692)。

我是否需要醫生轉介才能接種第三劑疫苗？

您無需醫生轉介即可接種第三劑疫苗。但是，如果您不確定自己是否符合資格，或者考慮到您的個人病史還有任何特殊問題，我們建議您與自己的醫生進行討論。所有患者在接種疫苗時須證明自己是否符合三個要求：包括年齡（大於 12 歲）；此前的疫苗接種史（至少提前 28 天完成了 Moderna 或 Pfizer 疫苗的前兩次接種）；以及根據上述定義，存在中度或重度免疫力低下症狀。

我需要攜帶此前接種疫苗的證明嗎？

如果您辦理了 CDC 卡，上面記錄了您此前接種疫苗的日期，您應該攜帶該卡片前往接種點。但是，如果您沒有該卡片，您需要證明自己在 28 天前接種了第二劑疫苗，然後才能接種第三劑疫苗。

第三劑疫苗是免費的嗎？

是的，符合資格的人群可免費接種第三劑疫苗。如果您有保險，此次接種可能會計費，但您無需支付任何自付費用或其他費用。

我需要預約接種第三劑疫苗嗎？

您無需預約，直接前往任何一家 NYC Health + Hospital 接種第三劑疫苗即可。如需查詢其他接種點，請瀏覽 nyc.gov/vaccinefinder 或致電 877-VAX-4-NYC (877-829-4692)。

我現在無法出行。可以申請在家接種第三劑疫苗嗎？

所有 12 歲及以上的紐約居民均可選擇在家接種疫苗。您可以瀏覽 forms.cityofnewyork.us/f/home 登記申請上門接種服務（無法透過 Internet Explorer 存取），或致電 877-VAX-4NYC (877-829-4692)。

這屬於「加強」劑嗎？

第三劑疫苗可以算是第一、二劑疫苗的延續，以幫助免疫力嚴重下降的人群儘量增強免疫力，免受病毒侵害，因此它被視為疫苗「基礎接種」（共 3 劑）的一部分。

本次注射的疫苗量與前兩次注射的疫苗量有區別嗎？

沒有區別。第三劑的疫苗量與前兩劑的疫苗量完全相同。

我患有慢性疾病（如糖尿病、心臟病、肥胖症、吸菸或慢性阻塞性肺病 (Chronic Obstructive Pulmonary Disease, COPD)），如果我感染了 COVID-19，就會有很高的重症風險。我應該接種第三針疫苗嗎？

儘管某些慢性疾病會使您在感染 COVID-19 之後有很高的病情惡化的風險，但您目前暫不需要接種第三劑疫苗。您之前接種的兩劑 Pfizer 或 Moderna 疫苗，或者一劑 Johnson & Johnson's Janssen 疫苗已被證實可以為大多數成年人提供足夠的保護來抗擊 COVID-19。

不過，隨著科學家和醫生對 COVID-19 和疫苗的瞭解愈發深入，這些建議可能發生變化。即使您現在暫時沒有資格，可能未來會有機會接種第三劑疫苗。

如果我已經接種了兩劑 Moderna 疫苗，第三劑仍然需要接種 Moderna 疫苗嗎？

您的第三劑疫苗接種 Moderna 或 Pfizer 均可。因為這兩種疫苗都屬於 mRNA 疫苗，工作原理相同。但是，如果您的年齡在 12 至 17 歲之間，您必須接種 Pfizer 疫苗，因為 FDA 正在對劑對 18 歲以下兒童的 Moderna 疫苗進行審批。如果您的前兩劑接種了 Pfizer 疫苗，無論您的年齡如何，您都可以接種 Pfizer 或 Moderna 疫苗作為您的第三劑。

我接種的是 Johnson & Johnson's Janssen 疫苗。我應該接種第三劑疫苗嗎？

目前，FDA 暫未批准對接種 Johnson & Johnson COVID-19 疫苗的免疫力低下者追加劑量。我們希望很快能獲得更多資訊。