

VACCINATIONS POUR TOUS

Doses de rappel du vaccin contre la COVID-19

Foire aux questions

La dose de rappel contre la COVID-19 est recommandée pour toute personne âgée de 12 ans ou plus qui a reçu sa deuxième dose du vaccin Pfizer ou Moderna contre la COVID-19 depuis au moins cinq mois, ou qui a reçu la dose unique du vaccin Johnson & Johnson (J&J) depuis au moins deux mois.

Qu'est ce qu'une dose de rappel ?

Une dose de rappel est une dose supplémentaire d'un vaccin après avoir terminé une série de vaccins. Elle sert à renforcer l'immunité contre le virus, car la protection peut avoir diminué au fil du temps (on parle d'immunité décroissante).

Qui peut recevoir une dose de rappel ?

Cinq mois après avoir reçu la deuxième dose des vaccins Pfizer ou Moderna, toute personne âgée de 12 ans ou plus doit recevoir une dose de rappel.

Deux mois après avoir reçu la dose unique du vaccin J&J, toute personne âgée de 18 ans ou plus doit recevoir une dose de rappel.

Pourquoi une dose de rappel est-elle recommandée ?

Les vaccins contre la COVID-19 sont encore très efficaces pour prévenir les maladies graves, les hospitalisations et les décès causés par la COVID-19. Toutefois, certaines études montrent que la protection contre l'infection conférée par les vaccins Pfizer ou Moderna peut commencer à diminuer après environ cinq mois, ou après environ deux mois pour

le vaccin J&J. Une dose de rappel peut apporter une protection supplémentaire aux personnes qui présentent un risque accru d'exposition à la COVID-19 ou de maladie grave liée à la COVID-19, en particulier avec la présence du variant Delta qui circule dans nos communautés.

Quelles sont les affections médicales qui augmentent le risque de complication de la COVID-19 ?

Les affections médicales qui augmentent le risque de complication de la COVID-19 sont le diabète, les problèmes cardiaques, les maladies rénales chroniques, les maladies pulmonaires chroniques, les maladies du foie, le cancer, la démence, le VIH et la grossesse. Pour en obtenir une liste complète, consultez : cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html

Qui présente un risque accru d'exposition à la COVID-19 sur son lieu de travail ou dans un autre milieu ?

Les emplois qui peuvent augmenter le risque d'exposition à la COVID-19 comprennent les travailleurs de la santé, les enseignants, le personnel des garderies et les employés des restaurants et des épiceries. Les foyers pour sans-abri et les prisons sont d'autres milieux susceptibles de présenter un risque accru d'exposition.

Comment savoir si j'ai besoin d'une dose de rappel ?

Consultez votre prestataire de soins de santé si vous avez des questions quant à la nécessité d'une dose de rappel. Si vous avez besoin d'aide pour trouver un prestataire, appelez le 311 ou le 212-COVID-19 (212-268-4319) et adressez-vous à un membre du personnel infirmier pour savoir si vous êtes admissible.

Les femmes qui sont enceintes et celles qui allaitent ou essaient de tomber enceinte peuvent-elles recevoir une dose de rappel ?

Les femmes enceintes et celles qui l'ont été récemment courent un risque accru de développer une forme grave de la COVID-19 par rapport aux autres femmes. Les femmes enceintes doivent se faire vacciner contre la COVID-19. Si les femmes enceintes répondent aux critères d'admissibilité, elles doivent recevoir une dose de rappel.

Quels sont les risques liés à l'administration d'une dose de rappel ?

Pour de nombreuses personnes qui ont reçu deux doses des vaccins Pfizer ou Moderna ou une seule dose du vaccin J&J, les avantages d'une dose de rappel l'emportent sur les risques. Jusqu'à présent, les réactions signalées après l'administration d'une dose de rappel étaient semblables à celles observées après l'administration des premières doses. La fatigue et les douleurs au bras sont les effets secondaires les plus fréquemment signalés. La plupart des effets secondaires étaient légers ou modérés.

La dose de rappel est-elle le même vaccin que les deux premières doses ?

Oui. La dose de rappel est le même vaccin que chacune des deux premières doses de Pfizer ou Moderna, ou que l'unique dose de J&J. Toutefois, la dose du rappel Moderna est deux fois moins importante que celle administrée pour les deux premières doses.

La marque de la dose de rappel que je reçois doit-elle être la même que celle du vaccin que j'ai reçu initialement ?

Les personnes vaccinées doivent essayer de recevoir le même vaccin que celui qu'elles ont reçu initialement comme rappel, mais elles ont le choix de passer à l'un des deux autres types de vaccin.

Quand dois-je recevoir une dose de rappel ?

Si vous êtes âgé de 12 ans ou plus, vous devez recevoir une dose de rappel cinq mois après avoir reçu votre deuxième dose des vaccins Pfizer ou Moderna contre la COVID-19. Si vous êtes âgé de 18 ans ou plus et que vous avez reçu la dose unique du vaccin J&J contre la COVID-19, vous devez recevoir une dose de rappel deux mois après avoir reçu votre dose initiale.

Si nous avons besoin d'une dose de rappel, cela signifie-t-il que les vaccins ne sont pas efficaces ?

Non. Les vaccins contre la COVID-19 sont efficaces pour prévenir les maladies graves, les hospitalisations et les décès. Ils sont même efficaces contre le variant Delta qui circule librement. Cependant, les experts en santé publique commencent à constater une légère diminution de la protection, en particulier dans certaines populations.

Où puis-je obtenir une dose de rappel gratuite ?

Les doses de rappel Pfizer et J&J sont disponibles dans les 11 hôpitaux du système NYC Health + Hospitals. Les doses de rappel Moderna sont disponibles sur tous les sites de NYC Health + Hospitals/Gotham Health. Vous n'avez pas besoin de vous rendre au même endroit où vous avez reçu vos deux premières doses du vaccin Pfizer ou Moderna ou votre unique dose du vaccin J&J. Rendez-vous dans n'importe quel hôpital de soins intensifs NYC Health + Hospitals ou site NYC Health + Hospitals/Gotham Health pour votre dose de rappel ou appelez le 1-877-829-4692 pour obtenir de l'aide dans plusieurs langues.

Puis-je recevoir une dose de rappel en même temps que d'autres vaccins (comme le vaccin contre la grippe) ?

Oui. Vous pouvez recevoir, sans encourir aucun danger, votre dose de rappel en même temps que d'autres vaccins, ou n'importe quand avant ou après. Si vous n'avez pas encore reçu votre vaccin contre la grippe, les deux sont disponibles dans les hôpitaux de soins intensifs de NYC Health + Hospitals.

Ai-je besoin d'une dose de rappel pour être complètement vacciné ?

Non. Les personnes sont considérées comme totalement vaccinées deux semaines après la prise de la deuxième dose d'un vaccin à deux doses (comme Pfizer ou Moderna) ou deux semaines après la prise du vaccin J&J à dose unique.

Les doses de rappel seront-elles obligatoires ?

Le mandat de vaccination de l'État de New York pour les travailleurs de la santé ne s'applique qu'aux première et deuxième doses. Le mandat n'inclut pas les doses de rappel.

Les doses de rappel sont-elles recommandées pour les enfants ?

À l'heure actuelle, toute personne âgée de 12 ans et plus est encouragée à recevoir une dose de rappel. Les personnes âgées de 12 à 17 ans qui ont reçu la série primaire de Pfizer il y a plus de cinq mois peuvent uniquement recevoir la dose de rappel de Pfizer. Certains enfants immunodéprimés âgés de 5 à 11 ans peuvent recevoir une nouvelle dose du vaccin Pfizer 28 jours après l'administration de la deuxième dose.