

全员接种

儿童 Pfizer COVID-19 疫苗

- + 第一针和第二针
- + 6 月龄至 4 岁儿童第三剂
- + 适用于免疫力低下人士的基础系列追加剂次
- + 适用于 5 岁及以上人士的加强针
- + 6 月龄至 4 岁接种成人强度的十分之一剂量
- + 5 至 11 岁接种成人强度的三分之一剂量

在我们的所有医院均可接种

随着 COVID-19 疫情的到来，保护自己和您的孩子免于生病尤为重要。

COVID-19 疫苗在降低患病、住院甚至死亡的风险方面是安全且高效的。

您的孩子接种 COVID-19 疫苗无需支付自付费用。请扫描二维码或致电 1-844-NYC-4NYC (1-844-692-4692)。

详细了解
COVID-19 疫苗



哪些人应接种 COVID-19 疫苗？

- + 6 月龄至 4 岁儿童可接种三针 Pfizer-BioNTech 儿童剂量疫苗（十分之一强度）
- + 5 至 11 岁儿童可接种两针 Pfizer-BioNTech 儿童剂量疫苗（三分之一强度）
- + 12 岁及以上儿童和成人可接种两针 Pfizer-BioNTech 疫苗
- + 5 岁及以上因疾病或治疗而导致免疫系统减弱的儿童可接受 Pfizer 基础系列疫苗追加剂次，即第三剂。

哪些人应接种 COVID-19 加强针？

所有 5 岁及以上的人士都应该在接种 Pfizer 或 Moderna COVID-19 基础系列疫苗后，至少间隔五个月接种一次加强针。

在至少五个月前接种过 Pfizer 基础系列疫苗的 5 至 17 岁的人员方有资格接种 Pfizer 加强针。

5 岁及以上免疫力低下的人士都应该在接种 Pfizer COVID-19 基础系列疫苗的追加剂次后，至少间隔三个月接种一次加强针（共四剂）。

NYC Health + Hospitals 系统中的医院可提供 Pfizer 和 J&J 疫苗。NYC Health + Hospitals/Gotham Health 接种点可为 5 至 11 岁儿童提供 Moderna 疫苗和 Pfizer 疫苗。有关所有接种点的清单，请访问我们的网站：nychealthandhospitals.org。