

التطعيمات للجميع

+ لقاحات Moderna لعلاج
COVID-19

+ لقاحات Pfizer لعلاج COVID-19
(لعمر بين 5 و 11 عامًا)

- الجرعات الأولى والثانية
- جرعات السلسلة الأولية الإضافية لأولئك
الذين يعانون من نقص المناعة
- الجرعات المعززة

متاحة هنا لجميع الأشخاص المؤهلين

مع COVID-19، أصبح الآن مهمًا أكثر من أي وقت
مضى أن تحمي نفسك وأحبائك من الإصابة بالمرض.

تعد لقاحات COVID-19 آمنة وعالية الفعالية في تقليل
خطر التعرض للمرض ودخول المستشفى لتلقي العلاج
وحتى الوفاة.

يمكنك الحصول على لقاح COVID-19 دون دفع أي
تكلفة من جيبك.

تعرف على المزيد حول اللقاح المناسب لك.

امسح رمز QR ضوئيًا أو اتصل على الرقم

1-844-NYC-4NYC (1-844-692-4692)



تعرف على المزيد حول
لقاح الإنفلونزا



تعرف على المزيد حول
لقاحات COVID-19



لقاح COVID-19

معظم الأفراد مؤهلون الآن للحصول على لقاح COVID-19:

- + يمكن للأشخاص في سن 5 إلى 11 سنة الحصول على اثنتين من جرعات الأطفال (ثلاث القوة) لـ Pfizer-BioNTech
- + يمكن للأشخاص في سن 12 عامًا وأكبر الحصول على جرعتين من Pfizer-BioNTech
- + يمكن للأشخاص في سن 18 عامًا وأكبر الحصول على جرعتين من لقاح Moderna أو جرعة واحدة من Johnson & Johnson/Janssen

جرعات السلسلة الأولية الإضافية من لقاح Pfizer أو Moderna أو Johnson & Johnson لعلاج COVID-19

جرعات السلسلة الأولية الإضافية من mRNA يُفضل إعطاؤها للأشخاص الذين حصلوا على جرعتهم الثانية من لقاح COVID-19 mRNA أو جرعة واحدة من Johnson & Johnson منذ 28 يومًا على الأقل، ولديهم جهاز مناعي ضعيف بسبب حالة أو علاج، و التي قد تشمل ما يلي:

- + العلاج النشط للسرطان
 - + زراعة الأعضاء والدواء المستخدم لتقليل قوة الجهاز المناعي
 - + زراعة الخلايا الجذعية خلال آخر عامين
 - + نقص المناعة الأولي المتوسط أو الشديد
 - + فيروس نقص المناعة البشرية (HIV) غير مُعالج أو متقدم
 - + العلاج النشط بجرعة عالية من الكورتيكوستيرويدات أو الأدوية الأخرى التي تضعف الجهاز المناعي بشكل معتدل أو شديد
- يتعين أن تبلغ من العمر 5 سنوات أو أكبر للحصول على جرعة سلسلة أولية إضافية من Moderna. في بعض المواقف، يمكنك التفكير في إعطاء لقاح Johnson & Johnson/ Janssen كجرعة سلسلة أولية إضافية. لا يُنصح بجرعات السلسلة الأولية الإضافية لمعظم الأشخاص الذين يعانون من حالات طبية أخرى مثل مرض السكري أو أمراض القلب أو الرئة.

جرعة معززة لعلاج COVID-19 - متلقو لقاح Moderna و Pfizer

يجب أن يحصل كل شخص يبلغ من العمر 5 عامًا أو أكثر على جرعة معززة بعد 5 أشهر على الأقل من تلقي الجرعة الثانية من سلسلة التطعيم الأولية من Moderna أو Pfizer لمكافحة COVID-19.

يجب على الأشخاص الذين تلقوا جرعتين من لقاح Pfizer أو Moderna محاولة الحصول على نفس اللقاح باعتباره جرعتهم المعززة، ولكن لديهم خيار التبديل إلى أي من أنواع اللقاحات الثلاثة المصرح بها في الولايات المتحدة.

الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم من 5 إلى 17 عامًا ممن حصلوا سابقًا على سلسلة Pfizer الابتدائية منذ أكثر من خمسة أشهر مؤهلون للحصول على جرعة Pfizer المعززة فقط.

جرعة معززة لعلاج COVID-19 - متلقو لقاح Johnson & Johnson

يجب أن يحصل كل شخص يبلغ من العمر 18 عامًا أو أكثر على جرعة معززة بعد شهرين على الأقل من تلقي جرعة اللقاح الأولية من COVID-19. تعد جرعات Moderna أو Pfizer (لقاحات mRNA COVID-19) مفضلة في معظم المواقف.

يجب أن يحصل الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة والذين تلقوا لـ J&J كجرعة أولى ولقاح mRNA بعد 28 يومًا على الأقل كجرعة إضافية على جرعة معززة بعد شهرين على الأقل من جرعة إضافية من لقاح mRNA، ليصبح المجموع 3 جرعات.

توفر المستشفيات الموجودة في نظام NYC Health + Hospitals لقاحات Pfizer و J&J. تقدم مواقع NYC Health + Hospitals/Gotham Health لقاح Moderna ولقاح Pfizer للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5-11 عامًا، للحصول على قائمة كاملة بالمواقع، تفضل زيارة موقعنا على الويب: nychealthandhospitals.org.