

تمام لوگوں کے لیے ویکسین

ویکسین Moderna COVID-19 +

ویکسین Pfizer COVID-19 +

(ان کے لیے جن کی عمریں 5 سے
11 سال کے درمیان ہیں)

- پہلی تے دوسری خوراکیں
- کمزور مدافعت رکھنے والوں کے لیے
- اضافی بنیادی سیریز کی خوراکیں
- بوسٹرز

یہاں پر تمام اہل افراد کے لیے دستیاب ہے

COVID-19 میں یہ بہت اہم ہے کہ آپ خود کو اور
اپنے پیاروں کو بیمار پڑنے سے بچائیں۔

COVID-19 کی ویکسینز محفوظ ہیں اور بیماری،
ہسپتال جانے اور حتیٰ کہ موت کا خطرہ کم کرنے میں
انتہائی مؤثر ہیں۔

آپ COVID-19 کی ویکسین بغیر کوئی رقم خرچ
کیئے حاصل کر سکتے ہیں۔

آپ کے لیے کون سی ویکسین بہتر ہے اس کے بارے
میں مزید معلوم کریں۔ QR کوڈ سکین کریں یا کال
1-844-NYC-4NYC (1-844-692-4692)



فلو ویکسینز کے

بارے میں مزید جانیں۔



COVID-19 ویکسینز

کے بارے میں مزید جانیں۔



نیویارک کے اکثر باشندے اس وقت COVID-19 کی ویکسین لگوانے کے اہل ہیں:

- + 5 سے 11 کی عمر کے درمیان بچے Pfizer-BioNTech طب اطفال کی دو خوراکیں (ایک تہائی طاقت) لگوا سکتے ہیں۔
- + 12 برس یا اس سے بڑی عمر کے افراد Pfizer-BioNTech ویکسین کی دو خوراکیں لگوا سکتے ہیں۔
- + 18 برس اور اس سے بڑی عمر کے افراد Moderna کی دو خوراکیں یا Johnson & Johnson/Janssen کی ایک خوراک لگوا سکتے ہیں۔

Pfizer, Moderna یا Johnson & Johnson کی COVID-19 ویکسین کی اضافی بنیادی سیریز کی خوراکیں

mRNA ویکسین کی اضافی بنیادی سیریز کی خوراکیں ان افراد کے لیے دستیاب ہیں جنہوں نے COVID-19 کی mRNA کی اپنی دوسری خوراک یا پھر Johnson & Johnson ویکسین کی ایک خوراک کم از کم 28 دن پہلے لگوائی ہو اور کسی عارضے یا علاج معالجے کے باعث ان کا مدافعتی نظام کمزور ہو۔ ان میں شامل ہیں:

- + سرطان کا ہونے والا علاج معالجہ
 - + اعضا کی پیوندکاری اور مدافعتی نظام کی طاقت کو کم کرنے کے لیے ادویات کا استعمال
 - + گزشتہ 2 روز کے دوران اسٹیم سیل کی پیوندکاری
 - + معتدل یا شدید قسم کی بنیادی مدافعتی نظام کی کمزوری
 - + ایسی ایچ آئی وی جو بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہے یا جس کا علاج معالجہ نہ ہوا ہو
 - + کارٹیکوایسٹروئڈ کی بڑی خوراک سے ہونے والا علاج معالجہ یا مدافعتی نظام کو معتدل یا شدید کمزور کرنے والی دیگر ادویات
- Pfizer کی اضافی بنیادی سیریز کی خوراک لگوانے کے لیے آپ کی عمر لازمی طور پر 5 برس یا اس سے بڑی اور Moderna کی اضافی بنیادی سیریز کی خوراک لگوانے کے لیے آپ کی عمر 18 برس یا اس سے بڑی ہونی چاہیے۔ بعض صورتوں میں آپ Johnson & Johnson/Janssen ویکسین کو اضافی بنیادی سیریز کی خوراک کے طور پر دینے پر بھی غور کر سکتے ہیں۔ زیادہ تر ایسے افراد جن کو دیگر طبی عارضے، مثلاً زیادہ تر طبی عارضے، دل یا پھپھڑوں کی بیماریاں ہیں ان کے لیے اضافی بنیادی سیریز کی خوراکیں کا مشورہ نہیں دیا جاتا۔

COVID-19 کی بوسٹر خوراک - Moderna اور Pfizer ویکسین لگوانے والے

- 5 برس یا اس سے بڑی عمر کے ہر فرد کو اپنی Moderna یا Pfizer کی COVID-19 کی ویکسین نیشن سیریز کی بنیادی خوراک کی دوسری خوراک لگوانے کے کم از کم 5 ماہ بعد بوسٹر کا ٹیکہ لگوانا چاہیے۔
- ایسے افراد جنہوں نے دونوں ٹھیکے Moderna یا Pfizer کی ویکسین کے لگوائے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ کوشش کر کے بوسٹر بھی انہی ویکسینز کی لگوائیں، تاہم اگر وہ چاہیں تو امریکہ میں ان کو تینوں میں سے کوئی ایک لگوانے کی اجازت ہے۔
- 5 سے 17 برس کی عمر کے درمیان ایسے افراد جنہوں نے 5 ماہ یا اس سے زیادہ عرصہ پہلے اپنی بنیادی سیریز میں Pfizer کے ٹیکے لگوائے تھے وہ اس وقت صرف Pfizer کا ہی بوسٹر ٹیکہ لگوانے کے اہل ہیں۔

COVID-19 بوسٹر خوراک - Johnson & Johnson ویکسین لگوانے والے

- 18 برس یا اس سے بڑی عمر کے ہر فرد کو COVID-19 ویکسین نیشن کی ایک بنیادی خوراک لگوانے کے کم از کم دو ماہ بعد بوسٹر کا ٹیکہ لگوانا چاہیے۔ اکثر صورتوں میں Moderna یا Pfizer (mRNA COVID-19 ویکسین) کو ترجیح دی جاتی ہے۔
- کمزور مدافعتی نظام رکھنے والے ایسے افراد جنہوں نے اپنی پہلی خوراک کے طور پر J&J اور mRNA ویکسین کم از کم 28 دن پہلے لگوائی ہے، ان کو mRNA ویکسین کے کم از کم 2 ماہ بعد اضافی بوسٹر لگوانا چاہیے، جو مجموعی طور پر 3 خوراکیں ہوں گی۔

NYC Health + Hospitals کے نظام میں موجود ہسپتالیں Pfizer اور J&J ویکسینز پیش کرتی ہیں۔ NYC Health + Hospitals کے مراکز میں 5 سے 11 برس کی عمر کے درمیان بچوں کے لیے Moderna ویکسین اور Pfizer ویکسین پیش کی جا رہی ہیں۔ مقامات کی مکمل فہرست کے لیے ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں:

nychealthandhospitals.org