

全员接种

+ Moderna COVID-19 疫苗

+ Pfizer COVID-19 疫苗

(适用于 5-11 岁的人士)

- 第一针和第二针
- 适用于免疫力低下人士的基础系列追加剂次
- 加强针

所有符合接种条件的人群均可在此接种

随着 COVID-19 疫情蔓延，保护自己和亲人免于生病尤为重要。

COVID-19 疫苗在降低患病、住院甚至死亡的风险方面是安全且高效的。

您可以接种 COVID-19 疫苗，无需支付自付费用。

详细了解您适合哪种疫苗。请扫描二维码或致电 **1-844-NYC-4NYC** (1-844-692-4692)。

详细了解
COVID-19 疫苗



详细了解流感
疫苗



哪些人应接种 COVID-19 疫苗？

COVID-19 疫苗

大多数人现在都符合 COVID-19 疫苗接种条件：

- + 5 至 11 岁人员可接种两针 Pfizer-BioNTech 儿童疫苗（三分之一强度）
- + 12 岁及以上人员可接种两针 Pfizer-BioNTech 疫苗
- + 18 岁及以上人员可接种两针 Moderna 疫苗或一针 Johnson & Johnson/Janssen 疫苗

辉瑞、Moderna 或 Johnson & Johnson COVID-19 疫苗的基础系列追加剂次

mRNA 疫苗的基础系列追加剂次适用于：至少在 28 天前接种过第二针 mRNA COVID-19 疫苗或单剂 Johnson & Johnson 疫苗，并且由于生病或接受治疗导致免疫系统虚弱的人群。这些可能包括：

- + 正在接受癌症的积极治疗
- + 接受过器官移植和降低免疫系统强度的药物
- + 过去 2 年中接受过干细胞移植
- + 中度或重度原发性免疫缺陷
- + 艾滋病晚期或艾滋病未经治疗
- + 正使用大剂量皮质类固醇或其他中度或严重削弱免疫系统的药物进行积极治疗

您必须年满 5 岁才能接种 Pfizer 基础系列追加剂次，年满 18 岁才能接种 Moderna 基础系列追加剂次。在某些情况下，您可以考虑接种 Johnson & Johnson/Janssen 疫苗作为基础系列的追加剂次。多数患有其他疾病（如糖尿病、心脏或肺部疾病）的人员不建议接种基础系列追加剂次。

COVID-19 加强针 — Pfizer 和 Moderna 疫苗接种者

所有 5 岁及以上的人士都应该在接种 Pfizer 或 Moderna COVID-19 基础疫苗系列后至少 5 个月接种一次加强针。

接种过两针 Pfizer 或 Moderna 疫苗的人应尽量接种相同的疫苗作为加强针，也可以选择获得美国授权的三种疫苗中的任意一种进行接种。

在至少 5 个月前接种过 Pfizer 基础系列疫苗的 5 至 17 岁的人员方有资格接种 Pfizer 加强针。

COVID-19 加强针 — Johnson & Johnson 疫苗接种者

所有 18 岁及以上的人士都应该在接种单剂基础 COVID-19 疫苗后至少 2 个月接种一次加强针。在大多数情况下，Pfizer 或 Moderna（mRNA COVID-19 疫苗）加强针是首选。

免疫力低下的人员，如果第一针接种 J&J 疫苗，并在至少 28 天后接种 mRNA 疫苗作为追加剂量，应在接种 mRNA 疫苗追加剂量后至少 2 个月接种加强针，共 3 剂。

NYC Health + Hospitals 系统中的医院可提供 Pfizer 和 J&J 疫苗。NYC Health + Hospitals/Gotham Health 接种点可为 5 至 11 岁的儿童提供 Moderna 和 Pfizer 的疫苗。有关所有接种点的清单，请访问我们的网站：nychealthandhospitals.org。