

## 모두를 위한 백신 접종

### Pfizer COVID-19 백신

- + 성인 접종
- + 6개월 이상 아이들을 위한 접종
- + 면역 저하자를 위한 추가의 기본 접종
- + 부스터샷

### 모든 적격자가 접종 가능

COVID-19로 인해, 건강 관리의 필요성이 어느 때보다 중요해졌습니다.

COVID-19 백신은 질병, 입원 및 사망 위험을 줄이는 데 매우 효과적이고 안전합니다.

본인 부담금 없이 COVID-19 백신을 맞을 수 있습니다.

본인에게 맞는 백신에 대해 자세히 알아보시기 바랍니다. QR 코드를 스캔하거나 1-844-NYC-4NYC(1-844-692-4692)로 전화해 주십시오

COVID-19 백신에  
대해 자세히 알아  
보세요



## COVID-19 백신은 누가 맞아야 하나요?

- + 6개월에서 4세까지의 아이들은 Pfizer-BioNTech 백신의 소아 용량(10분의 1)을 3회 접종 가능
- + 5-11세의 아이들은 Pfizer-BioNTech 백신의 소아 용량(3분의 1 용량)을 2회 접종 가능
- + 12세 이상의 아이들과 성인은 Pfizer-BioNTech 백신을 2회 접종 가능
- + 18세 이상은 Moderna 백신을 2회 또는 Johnson & Johnson/Janssen 백신을 1회 접종 가능
- + 질환이나 치료로 인해 면역체계가 저하된 5세 이상의 아이들과 성인은 3차 접종이라고도 하는 Pfizer 추가 기본 접종을 맞을 수 있습니다.

## 누가 COVID-19 부스터샷을 맞아야 하나요?

5세 이상은 Pfizer 또는 Moderna 기본 2차 COVID-19 접종을 받은 지 5개월 이상이 지나서 부스터샷을 접종해야 합니다.

Pfizer 또는 Moderna 백신을 2회 접종받은 사람들은 부스터샷 접종 시, 전과 동일한 백신을 맞도록 노력해야 하지만 미국에서 승인된 3가지 종류의 백신 중 하나로 선택하고 전환할 수 있습니다.

Pfizer 기본 접종을 받고 5개월 이상 경과한 5-17세는 Pfizer 부스터샷만 접종받을 수 있습니다.

Johnson & Johnson 백신을 맞은 18세 이상은 한 번만 맞는 기본 백신 접종을 마친 후 최소 2개월 후에 부스터샷을 맞아야 합니다. 대부분의 경우 Pfizer 또는 Moderna(mRNA COVID-19 백신) 부스터샷이 선호됩니다.

처음에 J&J 백신을 접종하고 28일 이상 경과한 후 추가 접종을 mRNA 백신으로 접종한 면역 저하자는 mRNA 백신으로 추가 접종을 하고 2개월 이상 경과했을 때 mRNA 백신으로 부스터샷을 접종하여 총 3회 접종해야 합니다.

NYC Health + Hospitals 시스템 소속의 병원들은 Pfizer 및 J&J 백신을 제공합니다. NYC Health + Hospitals/Gotham Health 접종소에서는 5-11세 아이들을 대상으로 Moderna 백신과 Pfizer 백신을 접종합니다. 접종소의 전체 목록은 저희 웹사이트 [nychealthandhospitals.org](https://nychealthandhospitals.org)를 방문해 주십시오.