

SZCZEPIENIA DLA WSZYSTKICH

Szczepionki przeciwko COVID-19 firmy Pfizer

- + Dawki dla osób dorosłych
- + Dawki dla dzieci od 6. miesiąca życia
- + Dodatkowe dawki „serii głównej” dla osób z obniżoną odpornością
- + Dawki przypominające

Dostępne tutaj dla wszystkich uprawnionych

W związku z pandemią COVID-19 ważniejsze niż kiedykolwiek jest, aby chronić siebie i swoich bliskich przed zachorowaniem.

Szczepionki przeciw COVID-19 są bezpieczne i bardzo skuteczne w zmniejszaniu ryzyka zachorowania, hospitalizacji, a nawet zgonu.

Możesz otrzymać szczepionkę przeciw COVID-19 bez ponoszenia kosztów.

Dowiedz się więcej o tym, która szczepionka jest odpowiednia dla Ciebie. Zeskanuj kod QR lub zadzwoń pod numer **1-844-NYC-4NYC** (1-844-692-4692)

Dowiedz się więcej
o szczepionkach
przeciw COVID-19



Kto powinien się zaszczepić przeciwko COVID-19?

- + Dzieci od 6. miesiąca do 4. roku życia mogą przyjąć trzy dawki pediatryczne (jedna dziesiąta dawki) szczepionki Pfizer-BioNTech.
- + Dzieci między 5. a 11. rokiem życia mogą przyjąć dwie dawki pediatryczne (jedna trzecia dawki) szczepionki Pfizer-BioNTech.
- + Dzieci od 12. roku życia oraz dorośli mogą otrzymać dwie dawki szczepionki Pfizer-BioNTech.
- + Osoby od 18. roku życia mogą otrzymać dwie dawki szczepionki Moderna lub jedną dawkę szczepionki Johnson & Johnson/Janssen.
- + Dzieci od 5. roku życia oraz dorośli z osłabionym układem odpornościowym w związku z chorobą lub leczeniem mogą otrzymać dodatkową dawkę szczepionki Pfizer w serii głównej – nazywaną również trzecią dawką.

Kto powinien otrzymać dawkę przypominającą szczepionki przeciwko COVID-19?

Dawkę przypominającą powinna przyjąć każda osoba od 5. roku życia, która co najmniej pięć miesięcy wcześniej przyjęła drugą dawkę szczepionki Pfizer albo Moderna przeciw COVID-19.

Osoby, które otrzymały dwie dawki szczepionki Pfizer lub Moderna, powinny spróbować otrzymać tę samą szczepionkę w ramach dawki przypominającej, ale mają możliwość zmiany szczepionki na dowolny z trzech rodzajów szczepionek dopuszczonych do obrotu w Stanach Zjednoczonych.

Dzieci w wieku od 5 do 17 lat, które w głównej serii szczepień otrzymały szczepionkę Pfizer ponad pięć miesięcy temu, kwalifikują się do przyjęcia dawki przypominającej jedynie szczepionki Pfizer.

Wszystkie osoby od 18. roku życia, które otrzymały szczepionkę Johnson & Johnson, powinny przyjąć dawkę przypominającą co najmniej dwa miesiące od przyjęcia dawki głównej. W większości sytuacji preferuje się przyjęcie dawki przypominającej Pfizer albo Moderna (szczepionki mRNA przeciwko COVID-19).

Osoby z obniżoną odpornością, które otrzymały szczepionkę J&J jako pierwszą dawkę oraz szczepionkę mRNA co najmniej 28 dni później jako dawkę dodatkową, powinny otrzymać dawkę przypominającą szczepionki mRNA co najmniej dwa miesiące po dodatkowej dawce szczepionki mRNA – łącznie trzy dawki.