

ВАКЦИНАЦИЯ ДЛЯ ВСЕХ

Вакцины против COVID-19 компании Pfizer

- + Дозы для взрослых
- + Дозы для детей от 6 месяцев и старше
- + Дополнительные дозы в рамках первичного курса вакцинации для лиц с ослабленным иммунитетом
- + Бустерные дозы

Доступны всем, у кого нет противопоказаний к вакцинации

В случае COVID-19 как никогда важно защитить себя и своих близких от заражения.

Вакцины против COVID-19 являются безопасными и с высокой эффективностью снижают риск заболевания, госпитализации и даже смерти.

Вы можете пройти вакцинацию от COVID-19 бесплатно.

Узнайте больше о том, какая вакцина подойдет именно вам. Отсканируйте QR-код или позвоните по номеру **1-844-NYC-4NYC (1-844-692-4692)**.

Узнайте больше
о вакцинах
против COVID-19



Кто должен вакцинироваться от COVID-19?

- + Дети в возрасте от 6 месяцев до 4 лет могут получить три педиатрические дозы (составляющие одну десятую от общей дозировки) вакцины Pfizer-BioNTech
- + Дети в возрасте от 5 до 11 лет могут получить две педиатрические дозы (составляющие треть от общей дозировки) вакцины Pfizer-BioNTech
- + Дети и взрослые в возрасте 12 лет и старше могут получить две дозы вакцины Pfizer-BioNTech
- + Взрослые в возрасте 18 лет и старше могут получить две дозы Moderna или одну дозу Johnson & Johnson/Janssen
- + Дети и взрослые в возрасте 5 лет и старше с ослабленным иммунитетом из-за болезни или лечения могут получить дополнительную дозу вакцины Pfizer из первичного курса вакцинации – также именуемую третьей дозой.

Кто должен пройти ревакцинацию от COVID-19?

Каждый человек в возрасте 5 лет и старше должен пройти ревакцинацию не ранее чем через пять месяцев с момента получения второй дозы первичного курса вакцинации от COVID-19 компании Pfizer или Moderna.

Лица, которые получили две дозы вакцин Pfizer или Moderna, должны попытаться пройти ревакцинацию той же вакциной, но они могут выбрать любую из трех вакцин, разрешенных в США.

Лица в возрасте от 5 до 17 лет, прошедшие первичный курс вакцинации Pfizer более пяти месяцев назад, могут пройти ревакцинацию только с использованием вакцины Pfizer.

Каждый человек в возрасте 18 лет и старше, кто получил вакцину Johnson & Johnson, должен пройти ревакцинацию не ранее чем через два месяца с момента первичной вакцинации. Бустерные дозы Pfizer или Moderna (вакцины против COVID-19 на основе мРНК) являются предпочтительными в большинстве ситуаций.

Лица с ослабленным иммунитетом, получившие вакцину J&J в качестве первой дозы и впоследствии – не ранее чем через 28 дней – получившие вакцину на основе мРНК в качестве дополнительной дозы, должны получить бустерную дозу вакцины на основе мРНК не ранее чем через два месяца после введения дополнительной дозы вакцины на основе мРНК; в общей сложности три дозы.

Больницы системы NYC Health + Hospitals предлагают вакцины Pfizer и J&J. Учреждения NYC Health + Hospitals/Gotham Health предлагают вакцину Moderna и вакцину Pfizer для детей в возрасте от 5 до 11 лет. Полный список учреждений размещен на нашем сайте: nychealthandhospitals.org.