

## 全员接种

### Pfizer COVID-19 疫苗

- + 成人疫苗
- + 适用于 6 月龄及以上儿童的剂量
- + 适用于免疫力低下人士的基础系列追加剂次
- + 加强针

### 所有符合接种条件的人群均可在此接种

随着 COVID-19 疫情的到来，保护自己和亲人免于生病尤为重要。

COVID-19 疫苗在降低患病、住院甚至死亡的风险方面是安全且高效的。

您接种 COVID-19 疫苗无需支付自付费用。

详细了解您适合哪种疫苗。请扫描二维码或致电 1-844-NYC-4NYC (1-844-692-4692)。

详细了解  
COVID-19 疫苗



## 哪些人应接种 COVID-19 疫苗？

- + 6 月龄至 4 岁儿童可接种三针 Pfizer-BioNTech 儿童剂量疫苗（十分之一强度）
- + 5 至 11 岁儿童可接种两针 Pfizer-BioNTech 儿童剂量疫苗（三分之一强度）
- + 12 岁及以上儿童和成人可接种两针 Pfizer-BioNTech 疫苗
- + 18 岁及以上成人可接种两针 Moderna 疫苗或一针 Johnson & Johnson/Janssen 疫苗
- + 5 岁及以上因疾病或治疗而导致免疫系统减弱的儿童可接受 Pfizer 基础系列疫苗追加剂次，即第三剂。

## 哪些人应接种 COVID-19 加强针？

所有 5 岁及以上的人士都应该在接种 Pfizer 或 Moderna COVID-19 基础系列疫苗后，至少间隔五个月接种一次加强针。

接种过两针 Pfizer 或 Moderna 疫苗的人应尽量接种相同的疫苗作为加强针，也可以选择获得美国授权的三种疫苗中的任意一种进行接种。

在至少五个月前接种过 Pfizer 基础系列疫苗的 5 至 17 岁的人员方有资格接种 Pfizer 加强针。

所有 18 岁及以上接种过 Johnson & Johnson 疫苗的人士都应该在接种基础剂次后，至少间隔两个月接种加强针。在大多数情况下，Pfizer 或 Moderna（mRNA COVID-19 疫苗）加强针是首选。

免疫力低下的人员，如果第一针接种 J&J 疫苗，并在至少间隔 28 天后接种 mRNA 疫苗作为追加剂次，则应在接种 mRNA 疫苗追加剂次后至少间隔两个月接种 mRNA 疫苗加强针，共三剂。

NYC Health + Hospitals 系统中的医院可提供 Pfizer 和 J&J 疫苗。NYC Health + Hospitals/Gotham Health 接种点可为 5 至 11 岁儿童提供 Moderna 疫苗和 Pfizer 疫苗。有关所有接种点的清单，请访问我们的网站：[nychealthandhospitals.org](https://nychealthandhospitals.org)。