

تمام لوگوں کے لیے ویکسین

Pfizer کی COVID-19 ویکسینز

- + بالغ کی خوراکیں
- + 6 ماہ اور اس سے بڑی عمر کے بچوں کی خوراکیں
- + کمزور مدافعت رکھنے والوں کے لیے اضافی بنیادی سیریز کی خوراکیں
- + بوسٹرز کے ٹیکے

یہاں پر تمام اہل افراد کے لیے دستیاب ہے

- COVID-19 کے باعث خود کو اور اپنے پیاروں کو بیمار پڑنے سے بچانا پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہے۔
- COVID-19 کی ویکسینز محفوظ ہیں اور بیماری، ہسپتال جانے اور حتیٰ کہ موت کا خطرہ کم کرنے میں انتہائی مؤثر ہیں۔
- آپ COVID-19 کسی اضافی ادائیگی کے بغیر حاصل کر سکتے ہیں۔
- آپ کے لیے کون سی ویکسین بہتر ہے اس کے بارے میں مزید معلوم کریں۔ کیو آر کوڈ سکین کریں یا کال 1-844-NYC-4NYC (1-844-692-4692)۔

COVID-19 ویکسینز
کے بارے میں مزید
معلومات حاصل کریں



COVID-19 کی ویکسین کس کو کروانی چاہیئے؟

- + 6 ماہ سے 4 برس کی عمر کے درمیان بچے Pfizer-BioNTech کی بچوں والی (ایک تھائی طاقت) خوراکیں لگوا سکتے ہیں۔
- + 5 سے 11 برس کی عمر کے درمیان بچے Pfizer-BioNTech بچوں والی کی دو خوراکیں (ایک تھائی طاقت) لگوا سکتے ہیں۔
- + 12 برس یا اس سے بڑی عمر کے افراد Pfizer-BioNTech ویکسین کی دو خوراکیں لگوا سکتے ہیں۔
- + 18 برس اور اس سے بڑی عمر کے افراد Moderna کی دو خوراکیں یا Johnson & Johnson/Janssen کی ایک خوراک لگوا سکتے ہیں۔
- + کسی عارضے یا علاج معالجے کے باعث 5 برس سے بڑی عمر کے بچوں اور بالغ افراد کا مدافعتی نظام اگر کمزور ہے تو وہ اپنی بنیادی سیریز کے حصے کے طور پر Pfizer کی اضافی خوراک لگوا سکتے ہیں، جس کو تیسری خوراک ب

COVID-19 کا بوسٹر کا ٹیکہ کیوں لگوانا چاہیئے؟

- 5 برس یا اس سے بڑی عمر کے ہر فرد کو اپنی Moderna یا Pfizer کی COVID-19 کی ویکسی نیشن سیریز کی بنیادی خوراک لگوانے کے کم از کم 5 ماہ بعد بوسٹر کا ٹیکہ لگوانا چاہیئے۔
- ایسے افراد جنہوں نے دونوں ٹھیکے Pfizer یا Moderna کی ویکسین کے لگوائے ہیں، ان کو چاہیئے کہ وہ کوشش کر کے بوسٹر بھی انہی ویکسینز کی لگوائیں، تاہم اگر وہ چاہیں تو ریاستہائے متحدہ امریکہ میں اجازت شدہ تینوں میں سے کوئی ایک ویکسین لگوا سکتے ہیں۔
- 5 سے 17 برس کی عمر کے درمیان ایسے افراد جنہوں نے پانچ ماہ یا اس سے زیادہ عرصہ پہلے اپنی بنیادی سیریز میں Pfizer کے ٹیکے لگوائے تھے وہ اس وقت صرف Pfizer کا ہی بوسٹر ٹیکہ لگوانے کے اہل ہیں۔
- 18 برس یا اس سے بڑی عمر کے ہر فرد کو کی Johnson & Johnson ویکسین لگوانے کے کم از کم دو ماہ بعد بوسٹر کا ٹیکہ لگوانا چاہیئے۔ اکثر صورتوں میں Pfizer یا Moderna (mRNA COVID-19) ویکسین کو ترجیح دی جاتی ہے۔
- کمزور مدافعتی نظام رکھنے والے ایسے افراد جنہوں نے اپنی پہلی خوراک کے طور پر J&J اور mRNA ویکسین کم از کم 28 دن پہلے لگوائی ہے، ان کو mRNA ویکسین کے کم از کم 2 ماہ بعد اضافی بوسٹر لگوانا چاہیئے، جو مجموعی طور پر تین خوراکیں ہوں گی۔

NYC Health + Hospitals کے نظام میں موجود ہسپتالیں اور J&J ویکسینز پیش کرتی ہیں۔ 5 سے 11 برس کی عمر کے درمیان بچوں کے لیے NYC Health + Hospitals/Gotham Health کے مقامات پر Moderna ویکسین اور Pfizer ویکسین پیش کی جاتی ہیں۔ مقامات کی مکمل فہرست کے لیے ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں: nychealthandhospitals.org