

COVID-19 疫苗加强针 常见问题解答

建议每个 5 岁或以上完成基础 COVID-19 疫苗系列接种的儿童接种 COVID-19 加强针（已接种 Moderna 作为基础系列疫苗的 5-11 岁儿童尚不符合条件接种加强针）。符合条件的 5 至 11 岁儿童应接种原始 Pfizer 单价加强针。12 岁及以上人士应接种更新版的二价加强针。

什么是疫苗加强针？

加强针是在完成全部基础疫苗剂次后接种的额外剂次，用于增强人体对病毒的免疫力，因为随着时间的推移，保护力可能已经下降（这被称为免疫力减退）。

哪些人可以接种加强针？

所有 5 至 11 岁的儿童都应该在接种 Pfizer 第二剂基础疫苗系列至少五个月后接种一剂原始单价加强针。目前，已接种 Moderna 作为基础系列疫苗的人士尚不符合条件接种加强针。

对于 12 岁及以上的人士，唯一获得授权的加强针是更新版的二价加强针。12 岁及以上的人士不能再接种原始单价加强针。

12 岁及以上的人士应在完成接种基础 COVID-19 疫苗系列或最后一剂加强针至少两个月后，再接种一剂更新版的二价加强针。

Pfizer-BioNTech 更新版的二价加强针已获授权用于 12 岁及以上的人士；Moderna 更新版的二价加强针已获授权用于 18 岁及以上的人士。

更新版的二价加强针与原始的单价加强针有何不同？

新的加强针是一种“二价”疫苗，这意味着它是一种新的配方，包含原始疫苗以及以奥密克戎及其亚型变异株 BA.4 和 BA.5 为标靶的新疫苗的组合。这就是为什么它是“更新版”。

为什么建议接种加强针？

COVID-19 疫苗在预防因 COVID-19 引起的重症、住院和死亡方面仍然有效。然而，研究表明，随着时间的推移，COVID-19 疫苗对感染的保护力开始下降。加强针可以通过“加强”免疫系统提供额外保护，尤其是对于那些罹患 COVID-19 重症风险较高的人。

哪些医疗状况会增加罹患 COVID-19 重症的风险？

会增加罹患 COVID-19 重症风险的医疗状况包括糖尿病、心脏疾病（包括高血压）、慢性肾病、慢性肺病、肝病、癌症、痴呆症、HIV 以及怀孕。如需完整列表，请参见：[cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/needextraprecautions/people-with-medical-conditions.html](https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/needextraprecautions/people-with-medical-conditions.html)

哪些人在工作场所或其他场所中的 COVID-19 暴露风险会增加？

可能增加 COVID-19 暴露风险的工作包括医护人员、教师、日间护理人员以及餐厅和杂货店工作者。其他可能增加暴露风险的场所包括无家可归者收容所和监狱。

我怎么知道自己是否需要接种加强针？

如果您对自己是否应接种加强针有疑问，请与您的医疗保健提供者交谈。如果您在寻找提供者方面需要帮助，请拨打 311 或致电 212-COVID-19 (212-268-4319)，并与护士讨论，了解您是否符合资格。

已怀孕、处于哺乳期或正在备孕的人能否接种加强针？

与未怀孕的人相比，已怀孕和刚怀孕的人罹患 COVID-19 重症的风险更高。怀孕的人应接种疫苗以抵抗 COVID-19。如果怀孕的人符合资格条件，则应接种加强针。

接种加强针有哪些风险？

接种加强针的好处大过任何风险。到目前为止，据报告，接种加强针后的反应与接种初始疫苗剂次后的反应相似。疲劳和手臂酸痛是最常报告的副作用。大多数副作用为轻度至中度并会自行消退。

我的加强针的品牌是否需要与我第一次接种的疫苗品牌相同？

接种过疫苗的人可以接种与其最初接种的基础疫苗系列或之前的加强针相同的疫苗品牌，或者可以选择改用另外两种疫苗中的任意一种。

如果我们需要接种加强针，是否意味着疫苗已经不起作用？

不是。COVID-19 疫苗在预防重症、住院和死亡方面效果良好。但是，随着时间的推移，公共卫生专家开始发现其保护力轻微减弱，特别是在某些高风险人群中。

我在哪里可以免费接种加强针？

在 NYC Health + Hospitals 系统中，有 11 家医院可接种 Pfizer 更新版加强针。在任意 NYC Health + Hospitals/Gotham Health 接种点均可接种 Moderna 更新版加强针。您不需要前往与接种基础疫苗系列或之前的加强针相同的地点。特定的地点提供免费预约接种。请拨打 1-877-829-4692 获得用多种语言提供的帮助。

我能否在接种其他疫苗（如流感疫苗）的同时接种加强针？

可以。在接种其他疫苗的同时或其前后任何时候接种加强针都是安全的。如果您尚未接种流感疫苗，则可在 NYC Health + Hospitals 急症护理医院接种点接种这两种疫苗。

我是否需要接种加强针才被视为完全接种？

不是。在接种两剂疫苗（如 Pfizer 或 Moderna）的第二针后两周，或接种单剂 J&J 疫苗后两周即被视为完全接种。

是否会强制要求接种加强针？

纽约州对医护人员的疫苗接种规定只适用于第一针和第二针。该规定不包括加强针。

是否建议儿童接种加强针？

目前，鼓励所有 5 岁及以上的儿童接种加强针（已接种 Moderna 作为基础系列疫苗的 5-11 岁儿童尚不符合条件接种加强针）。在超过 5 个月前接种过 Pfizer 基础系列疫苗的 5-11 岁儿童方符合条件接种 Pfizer 单价加强针。12 岁及以上的儿童符合条件接种更新版的二价 Pfizer 加强针，18 岁及以上的人士符合条件在接种基础 COVID-19 疫苗系列或上一剂加强针两个月后接种更新版的二价加强针。