

VAKSINIME PËR TË GJITHË

Vaksinat e Pfizer kundër COVID-19

- + Dozat për të rriturit
- + Dozat për fëmijë nga 6 muajsh e lart
- + Dozat shtesë të serisë primare për personat me imunitet të cenuar
- + Injeksionet përforcuese së bashku me injeksionin përforcues të përditësuar bivalent

Ofrohen këtu për të gjithë ata që kualifikohen

Me COVID-19 vijon të jetë më e rëndësishme se kurrë të mbroni veten dhe ata pranë jush nga sëmurja.

Vaksinat kundër COVID-19 janë të sigurta dhe tejet efikase në reduktimin e rrezikut nga sëmurja, shtrimi në spital dhe deri dhe vdekja.

Vaksinën kundër COVID-19 mund ta bëni pa shpenzime nga ana juaj.



Mësoni më tepër se cila vaksinë është e duhura për ju. Skanoni kodin QR ose telefononi në nr. **1-844-NYC-4NYC (1-844-692-4692).**

Kush duhet të vaksinohet kundër COVID-19?

- + Fëmijët e moshës 6 muajsh deri 4 vjeç mund të kryejnë tri doza pediatrike (një e dhjeta e fuqisë) së Pfizer-BioNTech
- + Fëmijët e moshës 5-11 vjeç mund të bëjnë dy doza pediatrike (një e treta e fuqisë) së Pfizer-BioNTech
- + Fëmijët dhe të rriturit nga 12 vjeç e lart mund të bëjnë dy doza të Pfizer-BioNTech
- + Të rriturit 18 vjeç e lart mund të bëjnë dy doza të Moderna ose një dozë të Johnson & Johnson/Janssen

Dozat shtesë të serisë primare të Pfizer

Dozat shtesë të serisë primare të vaksinës mRNA preferohen për personat që kanë sistem të dobësuar imunitar për shkak të ndonjë sëmundjeje apo trajtimi.

Dozat shtesë të serisë primare nuk rekomandohen për shumicën e njerëzve me probleme të tjera mjekësore, si p.sh. diabet, sëmundje të zemrës apo të mushkërive.

Kush duhet të bëjë injeksionin përforcues kundër COVID-19?

Fëmijët e moshës 5-11 vjeç që kanë bërë më parë serinë primare të Pfizer mbi pesë muaj më parë përfitojnë vetëm injeksionin përforcues monovalent të Pfizer.

Për personat e moshës 12 vjeç e lart, injeksioni i vetëm përforcues i autorizuar është injeksioni përforcues i përditësuar bivalent. Personat e moshës 12 vjeç e lart nuk mund ta marrin më injeksionin përforcues monovalent origjinal.

Personat e moshës 12 vjeç e lart duhet të marrin një dozë të injeksionit përforcues të përditësuar bivalent dy muaj të plotë pas serisë së tyre primare të vaksinës kundër COVID-19 ose injeksionit të fundit përforcues.

Të vaksinuarit mund të kryejnë të njëjtën vaksinë që kanë bërë fillimisht si serinë e tyre primare të vaksinës ose si injeksionin përforcues të mëparshëm, ose mund të kalojnë te cilido nga dy llojet e tjera të vaksinave.

Personat me imunitet të cenuar që kanë bërë J&J si dozë të parë dhe një vaksinë me mRNA të paktën 28 ditë më vonë si dozë shtesë, duhet të bëjnë një dozë përforcuese të një vaccine mRNA të paktën dy muaj pas dozës shtesë të vaksinës mRNA, për tri doza gjithsej.