

# SZCZEPIENIA DLA WSZYSTKICH

## Szczepionki Pfizer przeciwko COVID-19

- + Dawki dla osób dorosłych
- + Dawki dla dzieci od 6. miesiąca życia włącznie
- + Dodatkowe dawki „serii głównej” dla osób z obniżoną odpornością
- + Dawki przypominające, w tym zaktualizowana biwalentna dawka przypominająca

## Dostępne tutaj dla wszystkich uprawnionych

Nadal należy chronić siebie i swoich bliskich przed zachorowaniem na COVID-19.

Szczepionki przeciw COVID-19 są bezpieczne i bardzo skutecznie zmniejszają ryzyko zachorowania, hospitalizacji, a nawet zgonu.

Możesz otrzymać szczepionkę przeciw COVID-19 bez ponoszenia kosztów.



Dowiedz się więcej o tym, która szczepionka jest odpowiednia dla Ciebie. Zeskanuj kod QR lub zadzwoń pod numer **1-844-NYC-4NYC** (1-844-692-4692).

## Kto powinien zaszczepić się na COVID-19?

- + Dzieci między 6. miesiącem a 4. rokiem życia mogą przyjąć trzy dawki pediatryczne (jedna dziesiąta dawki) szczepionki Pfizer-BioNTech
- + Dzieci między 5. a 11. rokiem życia mogą przyjąć dwie dawki pediatryczne (jedna trzecia dawki) szczepionki Pfizer-BioNTech
- + Dzieci i dorośli od 12 roku życia włącznie mogą przyjąć dwie dawki szczepionki firmy Pfizer-BioNTech
- + Dorośli od 18. roku życia włącznie mogą przyjąć dwie dawki szczepionki firmy Moderna lub jedną dawkę szczepionki firmy Johnson & Johnson/Janssen

## Dodatkowe dawki szczepionki firmy Pfizer serii podstawowej

Dodatkowe dawki szczepionki mRNA serii podstawowej są zalecane dla osób, które mają osłabiony układ odpornościowy z powodu choroby lub leczenia.

Dodatkowej dawki serii podstawowej nie zaleca się w przypadku większości osób z innymi schorzeniami, takimi jak cukrzyca, choroby serca lub płuc.

## Kto powinien przyjąć dawkę podtrzymującą szczepienia przeciwko COVID-19?

Dzieci w wieku od 5 do 11 lat, które otrzymały podstawową serię szczepień szczepionką Pfizer ponad pięć miesięcy temu kwalifikują się tylko do monowalentnej dawki przypominającej Pfizer.

W przypadku osób od 12. roku życia włącznie jedyną zatwierdzoną dawką przypominającą jest zaktualizowana biwalentna dawka przypominająca. Osoby od 12. roku życia włącznie nie mogą przyjąć pierwszej monowalentnej dawki przypominającej.

Osoby od 12. roku życia włącznie powinny przyjąć zaktualizowaną biwalentną dawkę przypominającą dwa pełne miesiące po podstawowej serii szczepień przeciwko COVID-19 lub ostatniej dawce przypominającej.

Osoby zaszczepione mogą otrzymać szczepionkę tej samej firmy, co w ramach podstawowej serii szczepień lub wcześniejszej dawki przypominającej albo mogą zmienić markę na dowolny z dwóch pozostałych rodzajów szczepionek.

Osoby z obniżoną odpornością, które otrzymały szczepionkę J&J jako pierwszą dawkę oraz szczepionkę mRNA co najmniej 28 dni później jako dawkę dodatkową, powinny otrzymać dawkę przypominającą szczepionki mRNA co najmniej 2 miesiące po dodatkowej dawce szczepionki mRNA, łącznie 3 dawki.